

## Pflanzenschutzmittel im Anwendungsgebiet „Golfplatz“ (= Kat. 2) in der Kultur „Rasen“

→ Wirkstoffe + PSM-Produktbeispiele, die in dieser Kategorie gemäß § 17 PflSchG für Flächen der Allgemeinheit erlaubt sind

(Quelle: BVL 02-2021, PSM-Zulassungsstand: 09.03.21)

PSM Zulassungsnummer	Wirkstoff Frac = Resistenzgruppe Wirk = Wirkung (s=systemisch, ts=teilsyst., K= Kontakt)	Schadorganismus	Kultur (Anwendungsbereich)	Aufwandmenge/ha, max. Anzahl Anw. pro Jahr, Mindestabstand zw. Behandlungen	Datum <u>Ende</u> Haupt- zulassung AF=Auf- brauchfrist	Auflagen Anwendungs- bestimmungen (Auszug)
<b>Kumar</b> 007547-00/18-001	850g/kg Kaliumhydrogencarbonat Frac: -      Wirk: K	Echter Mehltau	Funktionsflächen Golfplatz	3 kg/ha in 600-800 l/ha Wasser max. 6 x, mind. 7-10 Tage	31.08.22	SF 251 SF 252
<b>Previcur Energy</b> 006219-00	530 g/l Propamocarp Frac: 28      Wirk: s 310 g/l Fosetyl Frac: 33      Wirk: s	Pythium-Arten	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees)	2,5 l/ha in 600 l Wasser max. 2x, mind. 7 Tage	30.04.22	NW 802    SF 251 SF 252
<b>Heritage</b> 006488-00 026488-00	500 g/kg Azoxystrobin Frac: 11      Wirk: ts	Schneeschnitzel, Schwarzbeinigkeit, Rost, Blattflecken, Anthracnose, Brown Patch	Rasen (Golfplatz: alle Funktionsflächen)	0,5 kg/ha in 800-1000 l Wasser max. 4x, mind. 14 Tage	31.07.21 31.12.22	NW 607, NW 607-01 NW 706    XX002 NW 800    SF 251 NW 802    SF 252
<b>Medaillon TL</b> 008105-00	125 g/l Fludioxinil Frac: 12      Wirk: K	Schneeschnitzel Anthracnose Rotspitzigkeit	Funktionsflächen Golfplatz	3 l/ha in 125-500 l Wasser max. 4x, pro Anwendung mind. 14 Tage	31.10.21 Verlängerung wird erwartet	NW 606    SF 251 NW 607    SF 252 NW 802
<b>Signum</b> 025483-00	67 g/kg Pyraclostrobin Frac: 11      Wirk: ts 267 g/kg Boscalid Frac: 7        Wirk: s	Dollarflecken Schneeschnitzel	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees)	1,5 kg/ha in max.1000 l Wasser max. 2x, mind. 14 Tage	31.07.22	NW 605-1 (50% 5m,75% 5m,90%*) XX005    SF 251 SF 245-01
<b>Exteris Stressgard</b> 008376-00	12,5g/l Fluopyram, Frac: 7        Wirk: s 12,5 g/l Trifloxystrobin Frac: 11      Wirk: ts	Schneeschnitzel, Dollarflecken	Funktionsflächen auf Golfplätzen	10 l/ha in 200-600 l/ha Wasser max. 2x, mind. 14-28 Tage	31.07.21	NW 606 (15m), NW 605-1 (50%10m, 75% oder 90% 5m), SF 251, SF 252
<b>ROMEO</b> 00A144-00/02-003	941 g/kg Cerevisane Frac: -        Wirk: K	Schneeschnitzel, Dollarflecken, Rhizoctonia, Typhula-Fäule, Anthracnose, Blattfleckenkrankheit, Fusarium, Leptosphaerulina australis, Curvularia, Bipolaris	Funktionsflächen auf Golfplätzen	0,75 kg/ha in 500-1000l Wasser max.25x, alle 7 Tage	23.04.2031	SF 251 SF 252



<b>Banvel 480 S</b> 00A076-	480g/l Dicamba	Zweikeimblättrige Unkräuter (ausgen: Spitz-Wegerich, Wiesen-Löwenzahn, Gemeine Braunelle)	Funktionsflächen auf Golfplätze (nicht im Aussaatjahr)	Spritzen 0,375l/ha in 200-400l Wasser/ha; max. 1x	31.12.21 Verlängerung wird erwartet	SF251 SF252
<b>HAKSAR Ultra 260 EW</b> 008675-00/00-001	20 g/l Clopyralid + 40 g/l Fluroxypyr + 200 g/l MCPA	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen (nicht im Aussaatjahr)	spritzen 3,5 l/ha in min. 200 bis 500 l/ha Wasser	30.04.22	NW 802, NW 606(10 m) SF243, 251, 252 SF276-28RA, SF278-2RA
<b>Dicotex</b> 005747-00	2,4 D, Dicamba, MCPA, Mecoprop-P,	Zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Einzelpflanzen</b> auf Funktionsflächen (nicht im Aussaatjahr)	<b>mit Rückenspritze</b> 100 ml/100 l Wasser für 100 m <sup>2</sup>	31.12.21	NW 802 SF 252, 254, <b>255</b>
<b>COM 503 15 H GR</b> 007821-00/00-003 <b>COMPO Floranid Rasendünger plus Unkrautvernichter</b> 027821-	2,4-D + Dicamba	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen, (nicht im Aussaatjahr)	streuen 300 kg/ha max. 1x	<b>ZE 20.02.20</b> <b>AF 29.08.21</b>  31.12.22	NW 802 SF 252, 259
<b>Roundup Ultra u.a.</b> 025937- 026923- <b>044142-</b> 072389- (z.B. Durano)	360 g/l Glyphosat	Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen	spritzen; 4l/ha in 100-500l/ha Wasser  072389- : spritzen, mit nachfolgendem Umbruch	15.12.2023	SF 251, 252, 245-02
<b>COM 502 02 H</b> COMPO Rasendünger mit Moosvernichter 006275-	Eisen-II-Sulfat	Moose	Golfplätze (nicht im Aussaatjahr)	300 kg/ha Streuen max. 2 x, März - Oktober	31.08.22	NW801
<b>PRIMO MAXX II</b> 008361-00	103,5 g/l Trinexapac	Halmverkürzung	Funktionsflächen auf Golfplätzen	0,4 - 3,2 l in 300-1000l Wasser max. 4x, 7-14 Tage	30.04.2021 Verlängerung wird erwartet	NW 802 SF275-28RA
<b>Regalis Plus</b> 007727-00	84,8 g/l Prohexadion	1-j. Rispe., Stauchen	Funktionsflächen auf Golfplätzen	1,5 kg/ha in 300-600 l Wasser max. 4x max. Mittel/Jahr: 3 kg/ha	31.12.2022	NW 802 SF 251, 252

<b>Karate Zeon</b> 024675-00/18	100 g/l Lambda- Cyhalothrin	Erdräupen (Agrotis sp.)	Rasen (Golfplatz:Greens, Tees, Fairways)	0,075 l/ha in 400-600l Wasser max.2x, mind. 10 Tage	31.12.22	NT 108 NW 607-1 SF 251 NW 802 SF 252
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	----------	--

**Wichtige zusätzliche Codes und Anwendungsbestimmungen** (Auszug aus der BVL-Liste für Flächen der Allgemeinheit und den PSM-Anwendungsbestimmungen)

NW800	Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.
NW801	Drän- und Oberflächenwasser von behandelten Funktionsflächen (Greens und Abschläge) sind in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abzuleiten.
NW802	Keine Anwendung auf Funktionsflächen mit künstlichem Schichtaufbau des Oberbodens und oberflächennahem Drainagesystem (z. B. auf Sportplätzen, Greens und Abschlägen auf Golfplätzen), es sei denn abfließendes Drän- und Oberflächenwasser wird in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abgeleitet.
NW607-1	siehe dort ... "Verlustmindernde Geräte" ... Abstände: 50% 10m, 75 % 5m, 90 % 5m (NW605-01: 50% 5m ,75% 1m, 90% 1m)
NT108	Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, ...
SF243	Nutzung behandelter Rasenfläche als Spiel- und Liegewiese erst nach dem nächsten Schnitt.
SF245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF245-02	Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF254	Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren Personen in einem Abstand von mindestens 3 m von der behandelten Fläche oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF255	Die behandelten Flächen sind für 48 h mit geeigneten Maßnahmen abzusperren.
SF 259	Es ist sicherzustellen, dass sich während der Anwendung, bis zur nächsten Bewässerung und anschließendem Abtrocknen keine unbeteiligten Personen auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF275-28RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-28RA	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF278-2RA	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Rasen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
XX002	Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich keine Personen unmittelbar an oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten.

XX005	Es ist dafür Sorge zu tragen, dass unbeteiligte Dritte bei der Ausbringung/Handhabung des Pflanzenschutzmittels nicht exponiert werden.
-------	---

**Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, sind grundsätzlich hier zu finden:**

[https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04\\_Pflanzenschutzmittel/Flaechen\\_Allgemeinheit.html?nn=11031326](https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Flaechen_Allgemeinheit.html?nn=11031326)

(www.bvl.de → Pflanzenschutzmittel → Aufgaben im Bereich Pflanzenschutzmittel → Zulassung von Pflanzenschutzmitteln → Zugelassene Pflanzenschutzmittel → Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind )