

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt

Stand: 16.03.2017

Herbizide:

Butisan		Art 51	31.10.2017
033401-00 Metazachlor		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
auf leichten Böden 1,5 l/ha, NG329: max. 1000 gramm Wirkstoff pro Jahr auf derselben Fläche; NG330: dies zählt auch für Pflanzenschutzmittel die den Wirkstoff enthalten; in den beiden Folgejahren Zulassungsstand gemäß Bundesamt für Verbraucherschutz und		Aufwandmenge 1,5 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 300 -600	
		Abstandsauflagen: 468, 604, 605, 606 Standard 5 50% 5 75% * 90% *	
Centium 36 CS		Art 28	31.12.2025
024798-00 Clomazone		Gef.Sym.	N
Indikation: einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
vor der Saat, VA, vor dem Pfl. oder 3-8 Tage nach dem Pfl. Bei Tageshöchsttemperatur >20°C nur zwischen 18:00-9:00 Bei Tageshöchsttemperatur >25°C keine Anwendung 1 Monat Flächenkontrolle im Umkreis von 100m, Aufhellungen sind dem PflSch-Dienst und Zulassungsinhaber zumelden		Aufwandmenge 0,25 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B3 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen: 468,101 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Devrinol FL		Art 28	31.12.2020
033916-00 Napropamid		Gef.Sym.	N
Indikation: Gegen Ackerfuchsschwanz, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
vor der Saat oder Pflanzung mit Einarbeitung Wirkungslücke Klettenlabkraut Für Babyleaf max. 0,85 l/ha		Aufwandmenge 2,5 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen: 468, 609-1 Standard 5 50% * 75% * 90% *	
Rosate Eco 360 TF		Art 28	31.12.2017
005036-00 Glyphosat		Gef.Sym.	0
Indikation: Ausfallgetreide, einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
bis 2 Tage vor der Saat 3,0 l/ha oder nach der Ernte oder dem Wiederergrünen 5,0 l/ha alter Name Dominator Neotec		Aufwandmenge 3,0 - 5,0 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen: 468, NT 101 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Dominator 480 TF		Art 28	31.12.2022
006923-00 Glyphosat		Gef.Sym.	N
Indikation: Ausfallgetreide, einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
bis 2 Tage vor Saat 2,25 l/ha oder nach der Ernte 3,75 l/ha		Aufwandmenge 3,75 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen: 468, NT 101 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Focus Ultra		Art 51	31.12.2025
033964-00 Cycloxdim		Gef.Sym.	-
Indikation: einjährige Einkeimblättrige Unkräuter, Quecke			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
2,5 l/ha gegen Gräser 5,0 l/ha gegen Quecke BBCH 11-48 ausgenommen Ausfallgetreide, bis 25 cm Wuchshöhe der Unkräuter		Aufwandmenge 5,0 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage 42 Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 150-600	
		Abstandsauflagen: 468, NT 101, NT 102 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Lentagran WP		Art 28	31.05.2017
033231-00 Pyridat		Gef.Sym.	Xi
Indikation: gegen zweikeimblättrige Samenunkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach dem auflaufen oder 3-4 Wo. nach dem pflanzen ab EC 16 (3-6 Blattstadium der Unkräuter) WP 734 Schäden an der Kulturpflanze sind möglich		Aufwandmenge 2,0 kg/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200-400	
		Abstandsauflagen: 468, 642, NT 103 Standard * 50% * 75% * 90% *	

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

MON 79351		Art 28	31.12.2016
006921-00 <i>Glyphosat</i>		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiedereergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Aufwandmenge	3,75 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	100 - 400
		Abstandsauflagen:	
		468, NT 103	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*
MON 79991		Art 28	31.12.2016
007535-00 <i>Glyphosat</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiedereergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Aufwandmenge	2,5 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	100 - 400
		Abstandsauflagen:	
		468, 642, NT 101	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*
MON 79991-SG		Art 51	31.12.2024
007525-00 <i>Glyphosat</i>		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Aufwandmenge	2,5 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Abstandsauflagen:	
		468, 642, NT 101	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Roundup Powerflex		Art 51	31.12.2022
006149-00 <i>Glyphosat</i>		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiedereergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Aufwandmenge	3,75 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Abstandsauflagen:	
		468, 642, NT 101	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Stomp Aqua		Art 51	31.07.2018
005958-00 <i>Pendimethalin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Bis BBCH 16, Anwendung nach dem Anwachsen der Kultur NT 145, NT 146, NT 170 - Wortlaut siehe unten*, max. Fahrgeschwindigkeit 7,5 Km/h, Windgeschwindigkeit max 3m/sec		Aufwandmenge	3,5 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	60
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Abstandsauflagen:	
		468, 605, 606, NT 108	
		Standard	20
		50%	20
		75%	10
		90%	5

Fungizide:

Askon		Art 51	31.12.2021
006902-00 <i>Difenoconazol + Azoxystrobin</i>		Gef.Sym.	N;Xn
Indikation: Kohlschwärze, Mycosphaerella, Weißer Rost, Echter Mehltau			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Anwendung ab Befallsbeginn bzw. sichtbar werden der ersten Symptome EC 37 - EC 47 ilm Abstand von 7 - 14 Tagen NW 800: keine Anwendung auf drainierten Flächen vom vom 01.11 bis 15.03		Aufwandmenge	1,0 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Abstandsauflagen:	
		468, 605, 606	
		Standard	5
		50%	5
		75%	*
		90%	*
Contans WG		Art 51	31.12.2018
024346-00 <i>Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) Verminderung der Bodenverseuchung			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Nacherntebehandlung 2,0 kg spritzen oder bei Befallsgefahr 4,0 kg/ha (10 cm) bzw. 8,0 kg/ha (20 cm) bei anschließender Bodenbearbeitung		Aufwandmenge	2,0 - 8,0 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B3
		Wasser l/ha	200 - 1000
		Abstandsauflagen:	
		468, 642	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Forum		Art 51	31.12.2018
034315-00 <i>Dimethomorph</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Falscher Mehltau, Weißer Rost			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
ab BBCH 14 im Abstand von 7-14 Tagen		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	2,0 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, 604, 605, 606
		50%	5
		75%	5
		90%	*
Flint			
024657-00 <i>Trifloxystrobin</i>		Art 51	31.01.2017
		Gef.Sym.	N; Xi
Indikation: Echter Mehltau (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), Pilzliche Blattfleckenerreger			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
BBCH 16-45		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,4 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, 604, 605, 606
		50%	5
		75%	5
		90%	*
Kumar			
007547-00 <i>Kaliumhydrogencarbonat</i>		Art 51	31.08.2020
		Gef.Sym.	-
Indikation: Echter Mehltau			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	3,0 kg/ha
		Anzahl	4
		Wartezeit in Tage	1
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Kumulus WG			
042273-00 <i>Schwefel</i>		Bio	Art 51
		Gef.Sym.	31.12.2020
Indikation: Echter Mehltau			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
EC 13-49 im Abstand von 7-10 Tagen		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	3,2 kg/ha
		Anzahl	8
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468,604
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Ortiva			
024560-00 <i>Azoxystrobin</i>		Art 51	31.12.2020
		Gef.Sym.	N
Indikation: Blattkrankheiten siehe Anmerkung			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Kohlschwärze (<i>Alternaria brassicicola</i>); Kohlschwärze (<i>Alternaria brassicae</i>); Weißer Rost (<i>Albugo candida</i>); <i>Mycosphaerella brassicicola</i>		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	1,0 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, 604, 605, 606, 609
		50%	5
		75%	5
		90%	*
Signum			
025483-00 <i>Boscalid + Pyraclostrobin</i>		Art 51	31.12.2019
		Gef.Sym.	N
Indikation: <i>Alternaria brassicae</i> und <i>brassicola</i>			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	1,0 kg/ha
		Anzahl	3
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, 604, 605, 606, 609
		50%	5
		75%	5
		90%	*

Insektizide:

Bulldock		Art 51	30.06.2017
023977-00 <i>beta-Cyfluthrin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,3 l/ha
		Anzahl	3
		Wartezeit in Tage	7
		Bienengefährlichkeit	B2
		Wasser l/ha	-
		Standard	468,604,605,606,NT 103
		50%	15
		75%	10
		90%	5

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Calypso		Art 51	09.05.2016
024714-00 <i>Thiachlopid</i>		Gef.Sym.	N; XN
Indikation: Kohlmottenschildlaus, Mehliges Kohlblattlaus, beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Aufgrund der Absenkung der RHM auf 0,4 mg/kg kann nicht sichergestellt werden das die RHM eingehalten wird		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,2 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	7
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, 604, 605, 606
		50%	5
		75%	*
		90%	*
Dipel ES		Art 28	31.12.2021
024080-00 <i>Bacillus thuringiensis</i> spp. <i>Kurstaki</i>		Gef.Sym.	Xi
Indikation: Kohlweißlings-Arten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,3 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	3
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	600
		Standard	642, 468
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Karate mit Zeon Technologie		Art 51	31.12.2022
024675-00 <i>lambda-Cyhalothrin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: saugende und beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	75 ml/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	7
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	-
		Standard	468, 604, 605, 606, NT 103
		50%	15
		75%	10
		90%	5
Micula		Art 28	31.09.2017
033743-00 <i>Rapsöl</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: mehliges Kohlblattlaus			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Pflanzengröße bis 50 cm: 12 l/ha		Abstandsauflagen:	
Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 18 l/ha		Aufwandmenge	12 - 18 l/ha
		Anzahl	3
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	600 - 900
		Standard	468, 642, 604
		50%	5
		75%	*
		90%	*
Mospilan SG		Art 51	30.04.2018
005655-00 <i>Acetamiprid</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Blattläuse und Weiße Fliege			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
0,25 kg/ha gegen Blattläuse		Abstandsauflagen:	
0,325 kg/ha gegen Weiße Fliegen		Aufwandmenge	0,25 kg/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	21
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, 605-1, 606
		50%	5
		75%	*
		90%	*
Movento OD 150		Art 28	31.08.2017
006554-00 <i>Spirotetramat</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Blattläuse, Weiße Fliege			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,48 l/ha
		Anzahl	3
		Wartezeit in Tage	3
		Bienengefährlichkeit	B1
		Wasser l/ha	300 - 600
		Standard	468
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Neudosan Neu		Art 51	31.12.2017
024207-00 <i>Kali-Seife</i>		Gef.Sym.	Xi
Indikation: saugende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
die Abstandsauflagen zählen bis zu einer Wuchshöhe von 50 cm, bei 50 - 125 cm zählen folgende Abstandsauflagen: Standard 15m; 50% 10m; 75% 5m; 90% *m		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	18 - 27 l/ha
		Anzahl	5
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	900 - 1350
		Standard	468, 604, 605, 606, 609
		50%	5
		75%	*
		90%	*

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Pirimor Granulat		Art 28	31.07.2017
052470-00 Pirimicarb		Gef.Sym.	N; T
Indikation:	Blattläuse		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
NT 6937: bis EC 16 oder unter Kulturschutznetze	Aufwandmenge 0,25 kg/ha	468, 604,609	
	Anzahl 2	Standard 5	
	Wartezeit in Tage 7	50% *	
	Bienengefährlichkeit B4	75% *	
	Wasser l/ha 500 - 1000	90% *	
Plenum 50 WG		Art 51	30.06.2017
005223-00 Pymetrozin		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation:	Blattläuse, Rapsglanzkäfer		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
	Aufwandmenge 0,4 kg/ha	468, 604,609, NT 101	
	Anzahl 3	Standard 5	
	Wartezeit in Tage 7	50% *	
	Bienengefährlichkeit B1	75% *	
	Wasser l/ha > 600	90% *	
SpinTor		Art 51	31.12.2017
005314-00 Spinosad		Gef.Sym.	N
Indikation:	freifressende Schmetterlingsraupen, Kohlflye Jungpflanzenbehandlung		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
BBCH 15-49 ab schlüpfen der ersten Raupen	Aufwandmenge 0,2 l/ha	468, 607, NT 103	
Summe max. 2 Anwendung einschl. Jungpflanzen Beh.	Anzahl 2	Standard --	
Jungpflanzenbehandlung mit 12ml/1000 Pflanzen , anschließend gut abbrausen, damit der Wirkstoff in den Wurzelballen gelangt	Wartezeit in Tage 3	50% 15	
	Bienengefährlichkeit B1	75% 10	
	Wasser l/ha 400 - 600	90% 5	
Spruzit Neu		Art 51	31.08.2020
024780-60 Pyrethrine + Rapsöl		Gef.Sym.	N
Indikation:	saugende und beißende Insekten		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
	Aufwandmenge 6,0 l/ha	468,604,605,606,NT 101	
	Anzahl 2	Standard 10	
	Wartezeit in Tage 3	50% 5	
	Bienengefährlichkeit B4	75% 5	
	Wasser l/ha 600	90% *	
Steward		Art 28	31.10.2018
024629-00 Indoxacarb		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation:	freifressende Schmetterlingsraupen		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
	Aufwandmenge 85 g/ha	468, 642,604	
	Anzahl 3	Standard *	
	Wartezeit in Tage 14	50% *	
	Bienengefährlichkeit B4	75% *	
	Wasser l/ha > 600	90% *	
Xen Tari		Art 28	31.12.2017
024426-00 Bacillus thuringiensis ssp. Azawai		Gef.Sym.	Xi
Indikation:	freifressende Schmetterlingsraupen		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
0,6 kg/ha gegen Schmetterlingsraupen (L1-L3)	Aufwandmenge 0,6 - 1,0 kg/ha	468, 642,604	
1,0 kg/ha gegen Eulenarten	Anzahl 6	Standard *	
	Wartezeit in Tage F	50% *	
	Bienengefährlichkeit B4	75% *	
	Wasser l/ha > 600	90% *	

Molluskizide:

Neu 1165 Profi		Art 28	31.12.2015
005955-00 Eisen-III-Phosphat		Gef.Sym.	-
Indikation:	Nacktschnecken		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:	
zwischen den Kulturpflanzen streuen	Aufwandmenge 50,0 kg/ha	Standard *	
	Anzahl 4	50% *	
	Wartezeit in Tage F	75% *	
	Bienengefährlichkeit B3	90% *	
	Wasser l/ha streuen		

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Neu 1181 M		Art 28	30.06.2017
006682-00 Eisen-III-Phosphat		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge	7,0 kg/ha
		Anzahl	4
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B3
		Wasser l/ha	streuen
		Abstandsauflagen:	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*

Neu 1186 M		Art 28	30.06.2017
007744-00 Eisen-III-Phosphat		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge	25,0 kg/ha
		Anzahl	4
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	streuen
		Abstandsauflagen:	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*

Delicia Schneckenlinsen		Art 28	31.05.2017
005323-00 Metaldehyd		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge	6,0 kg/ha
Die Wirkung des Mittels beruht auf einem Wasserentzug der Schnecken. Wird der Körperflüssigkeitsverlust z.B. durch Regen in kurzer Zeit ausgeglichen, kann der Bekämpfungserfolg beeinträchtigt werden.		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B3
		Wasser l/ha	streuen
		Abstandsauflagen:	
		Standard	642
		50%	*
		75%	*
		90%	*

Ferramol Schneckenkorn		Art 28	31.12.2017
024496-00 Eisen-III-Phosphat		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge	50,0 kg/ha
		Anzahl	4
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B3
		Wasser l/ha	streuen
		Abstandsauflagen:	
		Standard	*
		50%	*
		75%	*
		90%	*

Genehmigung nach § 22/2:

Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels ist erst nach einer einzelbetrieblichen Genehmigung nach § 22/2 möglich. Die einzelbetriebliche Genehmigung hat eine Gültigkeit für Flächen innerhalb Schleswig-Holsteins. Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an der Kulturpflanze liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Decis Flüssig		§ 22/2	
042973-00 Deltamethrin		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: saugende und beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Grundzulassung abgelaufen, Genehmigung wird hiermit zurückgezogen keine Anwendung möglich		Aufwandmenge	0,2 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	7
		Bienengefährlichkeit	B2
		Wasser l/ha	200 - 300
		Abstandsauflagen:	
		Standard	468, 607, NT 108
		50%	-
		75%	20
		90%	10

SpinTor		§ 22/2	
005314-00 Spinosad		Gef.Sym.	N
Indikation: Kleine Kohlflye			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Jungpflanzenbehandlung mit 12ml/1000 Pflanzen, anschließend gut abbrausen, damit der Wirkstoff in den Wurzelballen gelangt		Aufwandmenge	12 ml/1000 Pfl
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B1
		Wasser l/ha	400 - 600
		Abstandsauflagen:	
		Standard	468, 607, NT 103
		50%	15
		75%	10
		90%	5

Zulassungsübersicht Grünkohl

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Targa Super		§ 22/2	
034060-00 Quizalafop-P		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation:	Getreidedurchwuchs		
Anmerkung	Anwendungsbestimmungen		Abstandsaufgaben:
	Aufwandmenge	1,25 l/ha	468, NT 102
	Anzahl	1	Standard *
	Wartezeit in Tage	60	50% *
	Bienengefährlichkeit	B4	75% *
	Wasser l/ha	200 - 300	90% *

Dieser Hinweis entbindet den Anwender nicht, die jeweilige Zulassungssituation, die Gebrauchsanleitung genau zu beachten und zu prüfen ob eine einzelbetriebliche Genehmigung vorliegt

NT 145 Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungskategorie 90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" sind die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten.

NT 146 Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten.

NT 170 Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten.