

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Stand: 12.01.2017

Herbizide:

Butisan 033401-00 Metazachlor		Art 51	31.10.2017
		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: einjährige einkeimblt. Unkräuter, gemeine Quecke, Ausfallgetreide, Rispengras			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
auf leichten Böden 1,5 l/ha; Pflanzkultur bis 7T n.d. Pflanzen; max. 1000 gramm Wirkstoff pro Jahr auf derselben Fläche; dies zählt auch für Pflanzenschutzmittel die den Wirkstoff enthalten; in den beiden Folgejahren darf kein Metazachlor auf der Fläche eingesetzt werden		Aufwandmenge 1,5 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468, 605, 606 Standard 5 50% 5 75% * 90% *	
Centium 36 CS 024798-00 Clomazone		Art 51	31.12.2025
		Gef.Sym.	N
Indikation: einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Vorauflauf bis 5 Tage nach der Saat Bei Tageshöchsttemperatur >20°C nur zwischen 18:00-9:00 Bei Tageshöchsttemperatur >25°C keine Anwendung 1 Monat Flächenkontrolle im Umkreis von 100m, Aufhellungen Zulassungsstand gemäß Bundesamt für Verbraucherschutz und		Aufwandmenge 0,25 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B3 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Devrinol FL 033916-00 Napropamid		Art 51	31.12.2020
		Gef.Sym.	N
Indikation: Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
vor der Saat oder der Pflanzung mit einarbeiten (5 cm) nur für Babyleaf Nutzung		Aufwandmenge 0,85 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468, 642 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Rosate Eco 360 TF 005036-00 Glyphosat		Art 28	31.12.2017
		Gef.Sym.	0
Indikation: Ausfallgetreide, einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
bis 2 Tage vor der Saat 3,0 l/ha oder nach der Ernte oder dem Wiederergrünen 5,0 l/ha alter Name Dominator Neotec Abverkaufsfrist 31.07.2017 Aufbrauchsfrist 31.07.2018		Aufwandmenge 3,0 - 5,0 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468, NT 101 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Dominator 480 TF 006923-00 Glyphosat		Art 28	31.12.2022
		Gef.Sym.	N
Indikation: Ausfallgetreide, einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
bis 2 Tage vor der Saat 2,25 l/ha oder nach der Ernte oder dem Wiederergrünen 3,75 l/ha		Aufwandmenge 2,25 - 3,75 l Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 200 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468, NT 101 Standard * 50% * 75% * 90% *	
Focus Ultra 033964-00 Cycloxydim		Art 51	31.12.2025
		Gef.Sym.	-
Indikation: einjährige zweikeimblättrige Unkräuter und Ausfallgetreide			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
2,5 l/ha gegen einjährige einkeimblättrige Unkräuter und Aus- fallgetreide (ausgenommen: einjährige Rispe) 5,0 l/ha gegen gemeine Quecke		Aufwandmenge 5,0 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 150 - 600	
		Abstandsauflagen:	
		468, NT101, NT102 Standard * 50% * 75% * 90% *	
MON 79351 006921-00 Glyphosat		Art 28	31.12.2016
		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiederergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen Produkt nicht im Handel		Aufwandmenge 3,75 l/ha Anzahl 1 Wartezeit in Tage F Bienengefährlichkeit B4 Wasser l/ha 100 - 400	
		Abstandsauflagen:	
		468, NT 103 Standard * 50% * 75% * 90% *	

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

MON 7991		Art 28	31.12.2016
007535-00 Glyphosat		Gef.Sym.	-
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiederergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Abstandsauflagen:	
Produkt nicht im Handel		Aufwandmenge	2,5 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	100 - 400
		Standard	468, 642, NT 101
		50%	*
		75%	*
		90%	*
MON 7991-SG		Art 51	31.12.2024
007525-00 Glyphosat		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Abstandsauflagen:	
Produkt nicht im Handel		Aufwandmenge	2,5 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, 642, NT 101
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Roundup Powerflex		Art 51	31.12.2022
006149-00 Glyphosat		Gef.Sym.	N
Indikation: gegen Unkräuter und Gräser			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
nach der Ernte oder dem Wiederergrünen, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen		Abstandsauflagen:	
Produkt nicht im Handel		Aufwandmenge	3,75 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, 642, NT 101
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Select 240 EC		Art 51	30.12.2024
024366-00 Clethodim		Gef.Sym.	Xi
Indikation: einjährige einkeimblättrige Unkräuter			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Nur in Verbindung mit Actiro B (1,0 l/ha) einsetzen 0,75 l/ha gegen einjährige einkeimblättrige Unkräuter 1,0 l/ha gegen gemeine Quecke (15-20 cm Unkrauthöhe)		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	1,0 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, NT108, NT 109
		50%	20
		75%	10
		90%	5

Fungizide:

Askon		Art 51	31.12.2021
006902-00 Difenoconazol + Azoxystrobin		Gef.Sym.	N;Xn
Indikation: pilzliche Blattflecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
ab EC43		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	1,0 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	28
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, 605, 606
		50%	5
		75%	5
		90%	*
Contans WG		Art 28	31.12.2018
024346-00 Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08		Gef.Sym.	-
Indikation: Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) Verminderung der Bodenverseuchung			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Nacherntebehandlung 2,0 kg spritzen oder bei Befallsgefahr 4,0 kg/ha (10 cm) bzw. 8,0 kg/ha (20 cm) bei anschließender Bodenbearbeitung		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	2,0 - 8,0 kg/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B3
		Wasser l/ha	200 - 1000
		Standard	642
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Juwel		Art 51	30.04.2020
4310-00 Epoxiconazol + Kresoxim-methyl		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Echter Mehltau, pilzliche Blattfleckererreger			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	1,0 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	28
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 600
		Standard	468, 609, 701
		50%	5
		75%	*
		90%	*

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Kumulus WG		Bio	Art 51	31.12.2020
042273-00 Schwefel			Gef.Sym.	-
Indikation: Echter Mehltau				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
WP 747: Kulturschäden sind möglich, eindeutige Sortenunterschiede		Aufwandmenge	1,5 kg/ha	468
		Anzahl	6	Standard *
		Wartezeit in Tage	7	50% *
		Bienengefährlichkeit	B4	75% *
		Wasser l/ha	600	90% *
Netzschwefel Stulln		Bio	Art 51	31.12.2020
050006-00 Schwefel			Gef.Sym.	-
Indikation: Echter Mehltau				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
WP 747: Kulturschäden sind möglich, eindeutige Sortenunterschiede		Aufwandmenge	1,5 kg/ha	468
		Anzahl	6	Standard *
		Wartezeit in Tage	7	50% *
		Bienengefährlichkeit	B4	75% *
		Wasser l/ha	600	90% *
Opus			Art 51	31.12.2016
024183-00 Epoxiconazol			Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Echter Mehltau, Pilzliche Blattflecken				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome		Aufwandmenge	1,0 l/ha	468, 609
		Anzahl	1	Standard 5
		Wartezeit in Tage	28	50% *
		Bienengefährlichkeit	B4	75% *
		Wasser l/ha	400 - 600	90% *
Ortiva			Art 51	31.12.2020
024560-00 Azoxystrobin			Gef.Sym.	N
Indikation: pilzliche Blattfleckenerreger				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
ab 3 Laubblatt entfaltet		Aufwandmenge	1,0 l/ha	468, 605, 606, 701
		Anzahl	2	Standard 5
		Wartezeit in Tage	14	50% 5
		Bienengefährlichkeit	B4	75% *
		Wasser l/ha	200 - 400	90% *
Score			Art 51	31.12.2020
024353-00 Difenoconazol			Gef.Sym.	N
Indikation: Echter Mehltau, Pilzliche Blattfleckenerreger				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
ab Beginn des Dickenwachstums der Rübe, Wurzel bzw. Knolle (Durchmesser > 0,5 cm)		Aufwandmenge	0,4 l/ha	468, 605, 606, 705
		Anzahl	2	Standard 10
		Wartezeit in Tage	28	50% 5
		Bienengefährlichkeit	B4	75% 5
		Wasser l/ha	400 - 600	90% *
Thiovit Jet			Art 51	31.12.2020
050498-00 Schwefel			Gef.Sym.	-
Indikation: pilzliche Blattfleckenerreger				
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen		Abstandsauflagen:
WP 747: Kulturschäden sind möglich, eindeutige Sortenunterschiede		Aufwandmenge	1,5 kg/ha	468
		Anzahl	6	Standard *
		Wartezeit in Tage	7	50% *
		Bienengefährlichkeit	B4	75% *
		Wasser l/ha	600	90% *

Insektizide:

Calypso		Art 51	30.04.2018
024714-00 Thiachloprid		Gef.Sym.	N; XN
Indikation: Blattläuse			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Indikation Aufgrund einer RHM Absenkung zurückgezogen Aufbrauchsfrist 09.11.2017, wobei die Einhaltung der RHM nicht sichergestellt ist.		Aufwandmenge	0,2 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	14
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	400 - 600
			468, 604, 605, 606, 701
			Standard 5
			50% 5
			75% *
			90% *

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Fastac ME		Art 28	31.12.2024
007473-00 <i>alpha-Cypermethrin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
EC 12-49		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	0,3 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B1
		Wasser l/ha	200 - 400
		Standard	468,607-1
		50%	-
		75%	-
		90%	15
Fastac SC Super Contact		Art 51	31.12.2015
024018-00 <i>alpha-Cypermethrin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: beißende und saugende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Abverkaufsfrist 30.06.2016		Abstandsauflagen:	
Aufbrauchsfrist 30.06.2017		Aufwandmenge	0,125 l/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	28
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	200 - 400
		Standard	468,604,607,701,NT103
		50%	20
		75%	10
		90%	5
Kaiso Sorbie		Art 28	31.12.2023
006387-00 <i>lambda-Cyhalothrin</i>		Gef.Sym.	N; T
Indikation: beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	150 g/ha
		Anzahl	1
		Wartezeit in Tage	28
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	-
		Standard	468,605-1,606,NT108
		50%	10
		75%	5
		90%	5
Karate mit Zeon Technologie		Art 51	31.12.2022
024675-00 <i>lambda-Cyhalothrin</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: beißende und saugende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	75 ml/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	7
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	-
		Standard	468,604,605,606,NT103
		50%	10
		75%	5
		90%	*
Neudosan Neu		Art 28	31.12.2017
024207-00 <i>Kali-Seife</i>		Gef.Sym.	Xi
Indikation: saugende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
bis 50 cm Wuchshöhe		Abstandsauflagen:	
über 50 cm Wuchshöhe gelten Folgende Auflagen:		Aufwandmenge	18-27 l/ha
Standard 15m ; 50% 10m ; 75% 5m ; 90% * m)		Anzahl	5
		Wartezeit in Tage	F
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	900-1350
		Standard	468,604,605,606,642,609
		50%	5
		75%	*
		90%	*
Perfekthion		Art 51	31.12.2015
040090-00 <i>Dimethoat</i>		Gef.Sym.	N; Xn
Indikation: Kleine und Große Kohlfliege			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diesen Wirkstoff enthaltenden Mitteln.		Abstandsauflagen:	
Abverkaufsfrist 30.06.2016		Aufwandmenge	0,5 l/ha
Aufbrauchsfrist 30.06.2017		Anzahl	3
		Wartezeit in Tage	21
		Bienengefährlichkeit	B1
		Wasser l/ha	400 - 600
		Standard	468, NT 108
		50%	*
		75%	*
		90%	*
Spruzit Schädlingfrei		Art 51	31.08.2020
024780-00 <i>Pyrethrine + Rapsöl</i>		Gef.Sym.	N
Indikation: saugende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	
Behandlung bis zur sichtbaren Benetzung		Abstandsauflagen:	
		Aufwandmenge	6,0 l/ha
		Anzahl	2
		Wartezeit in Tage	3
		Bienengefährlichkeit	B4
		Wasser l/ha	600
		Standard	468,606,606,NT101
		50%	10
		75%	5
		90%	5
			*

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Turex		Art 51	30.04.2020
007638-00 <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>Aizawai</i> Stamm GC-91		Gef.Sym.	Xi
Indikation: beißende Insekten			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
		Aufwandmenge 1,0 kg/ha	642-1
		Anzahl 3	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B4	75% *
		Wasser l/ha 200-800	90% *
Xen Tari		Art 28	31.12.2017
024426-00 <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>Azawai</i>		Gef.Sym.	Xi
Indikation: freifressende Schmetterlingsraupen			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
0,6 kg/ha gegen Schmetterlingsraupen (L1-L3)		Aufwandmenge 0,6 - 1,0 kg/ha	468, 642, 604
1,0 kg/ha gegen Eulenarten		Anzahl 5	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B4	75% *
		Wasser l/ha > 600	90% *

Molluskizide:

Neu 1165 Profi		Art 28	31.12.2015
005955-00 <i>Eisen-III-Phosphat</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge 50,0 kg/ha	
		Anzahl 4	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B3	75% *
		Wasser l/ha streuen	90% *
Neu 1181 M		Art 28	30.06.2017
006682-00 <i>Eisen-III-Phosphat</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge 7,0 kg/ha	
		Anzahl 4	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B3	75% *
		Wasser l/ha streuen	90% *
Neu 1186 M		Art 28	30.06.2017
007744-00 <i>Eisen-III-Phosphat</i>		Gef.Sym.	-
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge 25,0 kg/ha	
		Anzahl 4	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B4	75% *
		Wasser l/ha streuen	90% *
SluXX		Art 28	31.12.2016
006683-00 <i>Eisen-III-Phosphat</i>		Gef.Sym.	
Indikation: Nacktschnecken			
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
zwischen den Kulturpflanzen streuen		Aufwandmenge 7 kg/ha	-
		Anzahl 4	Standard *
		Wartezeit in Tage F	50% *
		Bienengefährlichkeit B3	75% *
		Wasser l/ha streuen	90% *

Zulassungsübersicht Steckrüben

Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Umwelt



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Genehmigung nach § 22/2:

Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels ist erst nach einer einzelbetrieblichen Genehmigung nach § 22/2 möglich. Die einzelbetriebliche Genehmigung hat eine Gültigkeit für Flächen innerhalb Schleswig-Holsteins. Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an der Kulturpflanze liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Pirimor Granulat		§ 22/2	
052470-00 Pirimicarb		Gef.Sym.	N; T
Indikation:	Blattläuse		
Anmerkung		Anwendungsbestimmungen	Abstandsauflagen:
ab 3 Laubblatt der Kultur		<i>Aufwandmenge</i> 0,3 kg/ha	468, 605, 606, 101
zugelassen bis zum 31.07.2017, danach keine Anwendung mit dem Mittel als §22/2 möglich		<i>Anzahl</i> 2	<i>Standard</i> 10
		<i>Wartezeit in Tage</i> 14	50% 5
		<i>Bienengefährlichkeit</i> B4	75% 5
		<i>Wasser l/ha</i> 400 - 600	90% *

Dieser Hinweis entbindet den Anwender nicht, die jeweilige Zulassungssituation, die Gebrauchsanleitung genau zu beachten und zu prüfen ob eine einzelbetriebliche Genehmigung vorliegt