



LSV Sommerfuttergerste Relativerträge sandige Standorte Nordwest/Marsch 2018

Mittel der Intensitätsstufe 1 & 2 (Altenmellrich und Lage nur Stufe 2)

Sorte	Sandige Standorte Nordwest/Marsch					Mittel ***		
	Schuby	Albersdorf	Kastorf	Altenmellrich	Lage	2018	2017	2016
Versuchsstandort								
rel. 100 = dt/ha	33,5	42,9	66,4	68,9	67,4	56,6	79,2	68,6
KWS Dante*	97	101	99	105	97	99	101	103
RGT Planet*	101	102	99	99	105	103	104	103
Salome*	90	100	98	100	95	98	98	101
Sydney*	103	101	95	104	101	100	100	100
Vespa*	103	94	101	107	102	102	99	100
Subway*	111	101	104	95	98	100	104**	101**
RGT Atmosphere*	97	101	103	92	100	98	104**	98**
KWS Beckie*	98	101	101	99	101	99	104**	99**
Laureate	-	-	-	91	100	101	-	99**
GD 5% (rel.)	9	8	11	9	8	-	6	8

* Bezugsortensorten

** - Ergebnisse Wertprüfung 3 und 2 Bund bzw. EUSV (nicht direkt vergleichbar)

*** Ergebnisse von den Versuchsstandorten Wehnen, Rupennest und Holtorfloh aus Niedersachsen berücksichtigt und verrechnet