

Erste Auswertung

Der EU-Sortenversuch 1. Prüffahr wurde bundesweit im Zeitraum vom 21.08. – 08.09.2025 bei regional trockenen Böden ausgesät. In der Regel gelang es dennoch, dass Saatgut in eine ausreichend feuchte Bodenschicht zu legen oder Regen setzte rechtzeitig ein, sodass ausreichende bis gute Bestandsdichten erreicht wurden. In Hohenschulen, Sonnewalde und vor allem Leutewitz flogen Rapserrdföhe stark bis sehr stark zu. Der Winter verlief zunächst mild, wurde zu Ende hin jedoch kalt mit teils stärkeren Frösten. An den meisten Standorten waren die Bestände durch eine Schneeauflage geschützt, sodass keine Pflanzenverluste verzeichnet wurden und die Blattverluste moderat blieben. Vereinzelt wurde im Herbst Blattphoma festgestellt. Die Vegetation startete zunächst früh, wurde aber im März und April aufgrund kühler Witterung teils mit Nachfrösten bei zugleich hoher Sonneneinstrahlung gebremst. Ende April/Anfang Mai erwärmte es sich langsam und begünstigte an einigen Standorten eine lange Blüte. An der Mehrheit der Standorte verlief das Frühjahr trocken und die Bestände blieben meist kurz. Durch nachfolgende Hitze ab Mitte Juni setzte die Reife abrupt ein und in Gießen, Düllstadt, Moosburg und Leutewitz wurde der Raps bereits zwischen dem 10.-13.Juli geerntet. Insgesamt traten witterungsbedingt Lager und Krankheiten auch in 2026 kaum auf, sodass die Datengrundlage für eine Sortenbeschreibung in der Lager- und Krankheitsanfälligkeit unzureichend ist.

Alle Versuche wurden bis zur Ernte geführt und lediglich der Versuch am Standort **Klein Bünzow** konnte bis zur Erstellung der vorliegenden Auswertung noch nicht beerntet werden.

Mit Stand vom 04.08.2026 lagen somit für den Ertrag die Ergebnisse von 14 Standorten sowie die Qualitätsergebnisse von 12 Standorten vor.

Der Versuch am Standort **Futterkamp** zeigte sich die gesamte Vegetation über mit erheblichen Mängeln, was sich in einer erhöhten Grenzdifferenz der Ertragsergebnisse widerspiegelt. Allgemein weist die Prüfung eine unzureichende Versuchsgenauigkeit auf, sodass die Versuchsergebnisse gesamt aus der Serienwertung ausgeschlossen werden. Auf eine Analyse der Ernteproben vom Standort Futterkamp wurde verzichtet. Der Versuch am Standort Ihinger Hof präsentierte sich nach dem Winter gleichmäßig und vital. Nach einem trockenen Frühjahr verlief der Sommer heiß und trocken und führte zu einer vorzeitigen Abreife. Bei einem rel. geringen Ertragsniveau zeigten die Ergebnisse eine hohe Streuung. Die Ergebnisse vom **Ihinger Hof** fließen daher nicht in die Auswertung ein.

In die vorliegende Auswertung gingen somit für den Ertrag und die erhobenen Bonituren die Ergebnisse von 12 Standorten und für die Qualität die Ergebnisse von 11 Standorten ein. Für den Standort Idstein wurde zur Berechnung des Ölertrags und der Marktleistung der Ölgehalt im Mittel über 11 Standorte eingesetzt.

Die GSL-Gehalte wurden auf 91 % TS und auf 40 % Öl berechnet. Die Phoma-Befallswerte für die Indikatortypen Ludger an den Standorten sind in der Tab. 1 eingetragen. An keinem der Prüfstandorte wurde bei der Phomazeigersorte Ludger der Mindestbefall von 3,0 erreicht, sodass keine Ergebnisse der Phoma-Einzelpflanzen-Bonitur des gesamten Sortiments vorliegen.

Für die EU-Sorte Crown konnte die Sortenidentität durch das Bundessortenamt nicht bestätigt werden, sodass die Ergebnisse dieser Sorte nicht veröffentlicht werden. Für alle weiteren Prüfsorten hat das Bundessortenamt die Sortenidentität des für den EUSV 1 vorgelegten Saatgutes bestätigt.

Für die Bonituren zu „Lager nach Blüte“, „Lager bei Reife“ und „Lager bei Ernte“ wurden nur Versuche in die Mittelwertbildung einbezogen, an denen eine Differenzierung in der Standfestigkeit vorhanden war. In Sonnewalde erhielten alle Parzellen für Lager vor der Ernte einheitlich die Note 9. Aufgrund der fehlenden Differenzierung wurden diese Daten nicht in die Auswertung übernommen.

Für die Berechnung der Marktleistung wurde in Abstimmung mit den Ländern eine einheitliche Berechnungsformel eingeführt. Die Änderungen zu der bisher verwendeten Formel bestehen darin, dass ab Ernte 2026 die Berechnung der Marktleistung mittels der Rohdaten (Kornertrag pro Parzelle in kg, Trockensubstanz (Korn) in %) erfolgt und nicht mehr mittels der berechneten Kornertrages (Kornertrag bei 91 % TS). Ebenfalls fällt die Korrektur des Parzellenertrages um abzüglich 15 % weg und auch die Mehrwertsteuer von 10,7 % wird nicht mehr einbezogen. Es wurde sich zudem auf einen mehrjährigen Marktpreis von 42.- EUR/dt zwischen den Ländern geeinigt.

Angaben zur Parzellenform und zur Versuchsdurchführung sind in Tabelle 2 dargestellt.

Diese Ergebnisse können für Beratung und Veröffentlichungen verwendet werden, sind aber unbedingt als „vorläufige Ergebnisse“ zu kennzeichnen.

Tabelle 1: Versuchsstandorte und Ergebnislage mit Stand 04.08.2026:

lfd. Nr.	Standort	BL	Druscher- ergebnis	Ölgehalt	Fungizid Herbst	Fungizid Frühjahr	Phoma Ludger
1	Hohenschulen	SH	ja	ja	-	-	1,88
2	Futterkamp	SH	ja, n. E.	n. a.	-	-	2,16
3	Otterham	NI	ja	ja	n.R.	-	1,84
4	Wehnen	NI	ja	ja	-	-	1,81
5	Thüle	NRW	ja	ja	-	-	2,70
6	Gießen	HE	ja	ja	-	-	2,74
7	Idstein	HE	ja	nein	-	-	
8	Ihinger Hof	BW	ja, n. E.	ja, n. E.	-	-	1,74
9	Düllstadt	BY	ja	ja	-	-	1,76
10	Moosburg	BY	ja	ja	-	-	3,07
11	Malchow	MV	ja	ja	-	-	1,44
12	Klein Bünzow	MV	nein	nein	-	-	
13	Sonnewalde	BB	ja	ja	-	-	2,12
14	Gebstedt	ST	ja	ja	-	-	1,44
15	Leutewitz	SN	ja	ja	-	-	2,21

Es bedeuten: Soko = Entscheidung durch Sortenkommission; n.E. = nicht in Endauswertung;
n. b. = nicht analysiert, n. R. = nach Rücksprache

Verrechnungssorten: 100 rel. = Mittel über Ludger, LG Activus, KWS Ambos

Der Kornertrag ist jeweils absolut (dt/ha bei 91% TS) und relativ angegeben. Marktleistung und Ölertrag sind nur relativ angegeben. Grenzdifferenzen wurden mit dem t-Test berechnet.

Folgende mehrortige Auswertungen wurden am 04.08.2026 erstellt:

Ausw. 101: alle Merkmale im Mittel über alle Standorte, Teil 1
Ausw. 102: alle Merkmale im Mittel über alle Standorte, Teil 2
Ausw. 103: Kornertrag dt/ha über 12 Orte
Ausw. 104: Kornertrag rel. über 12 Orte
Ausw. 105: Marktleistung rel. über 12 Orte
Ausw. 106: Ölertrag rel. über 12 Orte
Ausw. 107: Ölgehalt (%) über 11 Orte
Ausw. 108: Proteingehalt (%) über 11 Orte
Ausw. 109: GSL-Gehalt (μmol) über 11 Orte
Ausw. 110: Tausendkornmasse (g) über 10 Orte
Ausw. 111: Mängel vor Winter über 12 Orte
Ausw. 112: Mängel nach Winter über 12 Orte
Ausw. 113: Pflanzenlänge (cm) über 12 Orte
Ausw. 114: Lager bei Reife über 3 Orte
Ausw. 115: Lager vor Ernte über 3 Orte
Ausw. 116: Reifeverzögerung des Strohs über 4 Orte

Rendsburg, den 05.08.2026

J. Gronow-Ehlers

L. Paustian-Lucht

Dr. C. Kleimeier

EUSV 1 Winterraps 2026 - Parzellenform, Saatstärke und S-Düngung der Standorte

Nr	Standort	Par- zelle ¹⁾	An- zahl Wdh.	Ernteparzelle		Steg- breite cm	Reihen- weite cm	Saatstärke K/m ²	Aussaat	gepflügt	S-Früh- jahr kg/ha
		PiP		L x B [m]	m ²				Datum		
1	Hohenschulen	x	4	11,0 x 1,4	15,4	40	28	50	18.08.2025	ja	40,0
2	Futterkamp	x	3	8,0 x 1,5	12,0	k. A.	25	45	21.08.2025	nein	48,7
3	Otterham	x	4	7,0 x 1,8	12,6	50	24	40	23.08.2025	ja	40,4
4	Wehnen	x	3	6,7 x 1,8	12,06	50	25	50	03.09.2025	ja	70,7
5	Thüle	x	4	5,77 x 2,0	11,54	50	20	50	29.08.2025	ja	44,0
6	Gießen	x	4	8,0 x 1,5	12,0	k. A.	25	50	04.09.2025	ja	25,0
7	Idstein	x	3	8,5 x 1,5	12,75	50	15	50	08.09.2025	nein	69,6
8	Ihinger Hof	x	4	8,0 x 1,625	13,0	k. A.	25	55	25.08.2025	nein	40,0
9	Düllstadt	x	3	9,0 x 1,5	13,5	45	25	50	01.09.2025	ja	k. A.
10	Moosburg	x	4	6,0 x 1,7	10,2	28	56	50	26.08.2025	ja	102,0
11	Klein Bünzow	x	3	9,0 x 1,3	11,7	28	28	50	04.09.2025	nein	-
12	Malchow	x	4	7,0 x 1,7	11,9	60	28,5	50	27.08.2025	nein	40,2
13	Sonnenwalde	x	3	9,0 x 1,5	13,5	52	28	50	27.08.2025	nein	38,0
14	Gebstedt	x	3	7,5 x 1,5	11,25	52	28	50	22.08.2025	nein	-
15	Leutewitz	x	3	6,75 x 1,93	13,03	60	20	50	03.09.2025	ja	60

¹⁾ DP = Doppelparzelle, PiP = Plot in Plot

Auswertung 101: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Standorte (Teil 1)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Korntrag dt/ha	Korntrag rel.	Marktleistung rel.	Ölertrag rel.	% Öl bei 91 % TS	% Protein 91% TS	% Rohprotein im fettfreien Samen	Glucosinolat (µmol; 91% TS, 40% Öl)	TKM 91%TS g	Datum Aufgang	Datum Blühbeginn	Datum Blühende	Datum Reife	Blühdauer (Tage)
N				12	12	12	12	11	11	11	11	10	12	12	12	9	12
Mittel (B)				40,0	40,0	1795	17,8	44,6	16,1	29,0	14,8	4,6					29
Ludger(B)	H	T	VRS	40,1	100	100	100	44,5	16,2	29,2	16,8	4,3	05.09.2025	20.04.2026	18.05.2026	03.07.2026	28
LG Activus(B)	H	T	VRS	39,5	99	99	98	44,5	16,2	29,1	14,0	5,0	05.09.2025	19.04.2026	19.05.2026	03.07.2026	30
KWS Ambos(B)	H		VRS	40,4	101	101	101	45,0	15,9	28,8	13,7	4,3	05.09.2025	19.04.2026	18.05.2026	02.07.2026	29
LG Baracuda	H	T+K	VGL	39,3	98	98	98	44,8	16,3	29,4	14,5	4,7	05.09.2025	18.04.2026	18.05.2026	03.07.2026	30
KWS Vamos	H		VGL	43,8	109	110	110	45,1	16,2	29,5	14,4	4,5	05.09.2025	18.04.2026	19.05.2026	02.07.2026	30
PT 331	H	K*	EU1	37,2	93	92	91	43,8	17,5	31,1	12,0	4,1	05.09.2025	24.04.2026	22.05.2026	03.07.2026	28
Cezanne	H		EU1	41,4	103	102	101	43,6	16,3	28,9	15,9	4,3	05.09.2025	21.04.2026	22.05.2026	03.07.2026	30
RGT Keos	H		EU1	42,4	106	106	106	44,7	16,3	29,5	12,4	4,2	05.09.2025	23.04.2026	20.05.2026	03.07.2026	27
Hornela	H		EU1	41,8	105	102	100	42,5	16,5	28,8	14,6	4,5	05.09.2025	21.04.2026	21.05.2026	03.07.2026	29
Hemma	H		EU1	41,9	105	103	101	43,0	16,5	28,9	15,0	4,8	05.09.2025	22.04.2026	21.05.2026	04.07.2026	29
Haaland	H		EU1	42,5	106	104	102	43,0	16,4	28,8	17,4	4,7	05.09.2025	21.04.2026	22.05.2026	04.07.2026	31
Commodore	H	T*	EU1	40,7	102	102	103	45,0	16,0	29,1	15,1	4,0	05.09.2025	19.04.2026	20.05.2026	02.07.2026	31
LG Adamant	H	T*	EU1	42,6	106	105	105	43,7	16,2	28,8	15,7	4,4	05.09.2025	20.04.2026	19.05.2026	03.07.2026	30
LG Atkins	H	T*	EU1	41,1	103	102	101	44,0	16,6	29,6	13,4	4,6	05.09.2025	21.04.2026	20.05.2026	03.07.2026	29
Heden	H		EU1	42,3	106	102	100	42,3	17,5	30,3	14,7	4,7	05.09.2025	21.04.2026	21.05.2026	03.07.2026	30
Hindiana	H		EU1	42,4	106	104	103	43,5	16,5	29,2	18,5	4,5	05.09.2025	22.04.2026	20.05.2026	03.07.2026	29
Exantra	H	T*	EU1	39,7	99	99	98	44,2	16,2	29,0	17,9	4,2	05.09.2025	22.04.2026	21.05.2026	03.07.2026	29
RGT Eros	H		EU1	43,1	108	108	108	44,8	16,1	29,1	13,5	4,3	05.09.2025	20.04.2026	20.05.2026	02.07.2026	30
Mittel				41,1	103	102	101	44,0	16,4	29,3	15,0	4,4	05.09.2025	20.04.2026	20.05.2026	02.07.2026	29

Typ: H = Hybridsorte

¹⁾ E = besondere Eigenschaft: K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 102: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Standorte (Teil 2)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Aufgang Tage nach 1.1.	Blühbeginn Tage nach 1.1.	Blühende Tage nach 1.1.	Blühdauer (Tage)	Reife Tage nach 1.1.	Mängel nach Aufgang 1-9	Mängel vor Winter 1-9	Mängel nach Winter 1-9	Dif. v/n Winter	Mängel bei Blühbeginn 1-9	Mängel vor Reife 1-9	Mängel Ernte 1-9	Massenb.v.W. 1-9	Entw. v. Winter	Stängelbildung bis Vegetationsbeginn	Pflanzenlänge cm	Lager nach Blüte 1-9	Lager bei Reife 1-9	Lager vor Ernte 1-9	Reifz.Stroh 1-9	Auswinterung 1-9	Sclerotinia 1-9
N				12	12	12	12	9	11	12	12	12	9	6	1	2	9	7	12	1	3	3	4	2	2
Mittel (B)				248	109	138	29	184	1,7	2,2	2,3	-0,1	1,5	1,3	1,0	6,5	6,1	1,4	147	1,9	2,7	2,8	4,2	3,0	2,4
Ludger(B)	H	T	VRS	248	110	138	28	184	1,7	2,3	2,5	-0,2	1,6	1,3	1,0	6,8	6,2	1,5	145	1,3	2,5	2,8	4,0	3,0	2,4
LG Activus(B)	H	T	VRS	248	109	139	30	184	1,9	2,4	2,5	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,1	6,0	1,3	141	1,0	1,9	2,1	4,5	3,2	2,3
KWS Ambos(B)	H		VRS	248	109	138	29	183	1,4	1,9	2,0	0,0	1,3	1,2	1,0	6,6	6,2	1,5	155	3,3	3,8	3,5	3,9	2,8	2,6
LG Baracuda	H	T+K	VGL	248	108	138	30	184	1,7	2,4	2,3	0,1	1,5	1,3	1,0	6,5	6,2	1,4	152	1,3	2,5	2,7	4,3	2,3	2,4
KWS Vamos	H		VGL	248	108	139	30	183	1,8	2,4	2,5	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,5	6,1	1,5	152	2,0	2,9	3,0	4,8	2,4	2,0
PT 331	H	K*	EU1	248	114	142	28	184	1,7	2,2	2,3	-0,1	1,7	1,4	1,0	6,9	6,4	1,5	164	1,0	1,8	1,8	5,2	3,5	1,6
Cezanne	H		EU1	248	111	142	30	184	1,7	2,2	2,3	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,7	6,4	1,4	161	2,7	3,1	3,1	4,8	2,8	2,5
RGT Keos	H		EU1	248	113	140	27	184	1,8	2,4	2,5	-0,1	1,6	1,4	1,0	6,2	6,1	1,5	154	1,3	2,1	2,2	4,9	2,6	1,6
Hornela	H		EU1	248	111	141	29	184	1,7	2,4	2,5	-0,1	1,9	1,3	1,0	7,2	6,4	1,4	162	1,7	2,1	2,3	4,3	2,7	2,0
Hemma	H		EU1	248	112	141	29	185	1,6	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,3	1,0	7,0	6,4	1,5	159	1,5	2,5	2,3	4,3	2,5	2,0
Haaland	H		EU1	248	111	142	31	185	1,6	2,3	2,5	-0,2	1,7	1,4	1,0	6,7	6,3	1,5	157	1,0	2,1	2,2	4,7	3,0	1,6
Commodore	H	T*	EU1	248	109	140	31	183	1,6	2,1	2,3	-0,2	1,7	1,4	1,0	7,1	6,4	1,3	151	1,3	2,3	2,2	5,4	2,9	2,1
LG Adamant	H	T*	EU1	248	110	139	30	184	1,7	2,2	2,5	-0,3	1,7	1,4	1,0	7,3	6,5	1,5	156	1,0	2,1	2,3	4,3	2,3	2,1
LG Atkins	H	T*	EU1	248	111	140	29	184	1,8	2,2	2,3	-0,2	1,7	1,3	1,0	6,1	6,1	1,3	148	1,0	2,0	1,9	5,6	2,7	1,6
Heden	H		EU1	248	111	141	30	184	1,8	2,4	2,5	-0,1	1,7	1,4	1,0	6,5	6,1	1,5	157	1,3	2,3	2,3	4,6	2,7	2,0
Hindiana	H		EU1	248	112	140	29	184	1,6	2,1	2,2	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,7	6,2	1,4	161	1,0	2,1	2,1	4,1	2,5	2,0
Exantra	H	T*	EU1	248	112	141	29	184	1,7	2,1	2,3	-0,2	1,6	1,3	1,0	6,8	6,2	1,4	164	1,3	2,6	2,8	3,6	2,4	2,3
RGT Eros	H		EU1	248	110	140	30	183	1,7	2,4	2,3	0,1	1,5	1,3	1,0	6,4	6,3	1,4	160	2,5	2,6	2,3	5,6	2,8	1,6
Mittel				248	110	140	29	183	1,7	2,2	2,4	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,7	6,2	1,4	155	1,5	2,4	2,4	4,7	2,7	2,0

Typ: H = Hybridsorte ¹⁾ E = besondere Eigenschaft: K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz
K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters
T = TuYV-Resistenz
T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 103: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Kornertrag dt/ha

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				39,7	42,6	23,6	44,7	36,0	54,5	54,3	42,1	35,9	26,5	39,1	41,0	40,0
Ludger(B)	H	T	VRS	43,1	39,0	22,5	44,5	39,7	56,7	54,0	42,1	35,8	25,2	36,5	41,9	40,1
LG Activus(B)	H	T	VRS	34,4	43,2	24,6	42,7	32,9	58,3	53,7	42,6	35,8	25,2	41,3	39,9	39,5
KWS Ambos(B)	H		VRS	41,7	45,7	23,8	46,8	35,3	48,6	55,1	41,6	36,2	29,1	39,5	41,2	40,4
LG Baracuda	H	T+K	VGL	37,9	44,0	23,2	44,2	37,1	52,5	55,8	41,2	35,4	25,7	36,5	37,6	39,3
KWS Vamos	H		VGL	43,9	46,8	27,5	50,4	41,6	53,4	59,2	44,3	40,2	29,6	40,9	47,7	43,8
PT 331	H	K*	EU1	35,9	40,5	20,1	40,4	39,0	50,0	55,9	39,2	29,8	25,0	37,0	33,7	37,2
Cezanne	H		EU1	41,7	43,9	26,8	45,7	47,6	48,8	58,4	44,2	37,7	30,0	30,9	40,9	41,4
RGT Keos	H		EU1	38,4	45,8	26,0	45,6	45,3	54,4	59,4	44,0	34,5	30,1	42,8	42,4	42,4
Hornela	H		EU1	45,9	39,1	26,5	44,2	41,3	51,8	55,0	44,6	40,3	29,9	37,2	46,3	41,8
Hemma	H		EU1	46,9	44,6	26,0	46,0	45,0	50,9	53,4	44,5	37,6	29,9	37,1	41,1	41,9
Haaland	H		EU1	44,2	46,9	25,7	47,3	44,6	52,5	54,0	43,8	40,1	27,0	41,9	41,7	42,5
Commodore	H	T*	EU1	37,7	46,8	21,6	46,0	43,2	55,2	57,3	42,5	33,9	25,5	37,9	40,9	40,7
LG Adamant	H	T*	EU1	40,3	41,6	27,8	48,0	47,0	54,0	56,3	47,4	40,6	27,3	39,2	41,5	42,6
LG Atkins	H	T*	EU1	38,1	43,5	26,2	48,6	43,4	52,7	53,5	42,6	39,7	26,6	37,7	41,1	41,1
Heden	H		EU1	41,7	46,8	23,3	48,0	44,4	57,2	58,0	43,5	41,1	25,9	37,0	41,3	42,3
Hindiana	H		EU1	44,3	46,4	25,5	44,0	46,4	49,2	55,8	43,0	39,1	29,6	41,5	44,2	42,4
Exantra	H	T*	EU1	37,1	39,6	26,2	42,4	44,1	46,0	53,7	42,0	38,4	28,0	40,2	38,9	39,7
RGT Eros	H		EU1	39,2	48,5	23,9	47,0	46,9	54,7	65,4	43,5	35,0	28,7	41,9	42,9	43,1
Mittel				40,3	44,1	24,6	45,5	42,3	52,8	56,3	43,2	37,0	27,5	38,6	41,2	41,1
Grenzdif.				3,9	4,3	2,2	3,4	3,4	5,7	4,4	2,4	2,4	2,1	3,3	3,7	

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 104: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Kornertrag rel.

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				39,7	42,6	23,6	44,7	36,0	54,5	54,3	42,1	35,9	26,5	39,1	41,0	40,0
Ludger(B)	H	T	VRS	108	91	95	100	110	104	100	100	100	95	93	102	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	87	101	104	96	92	107	99	101	100	95	106	97	99
KWS Ambos(B)	H		VRS	105	107	101	105	98	89	102	99	101	110	101	100	101
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	103	98	99	103	96	103	98	98	97	93	92	98
KWS Vamos	H		VGL	110	110	116	113	116	98	109	105	112	112	105	116	109
PT 331	H	K*	EU1	90	95	85	91	109	92	103	93	83	94	95	82	93
Cezanne	H		EU1	105	103	113	102	132	89	108	105	105	113	79	100	103
RGT Keos	H		EU1	97	107	110	102	126	100	109	105	96	113	110	103	106
Hornela	H		EU1	116	92	112	99	115	95	101	106	112	113	95	113	105
Hemma	H		EU1	118	105	110	103	125	93	98	106	105	113	95	100	105
Haaland	H		EU1	111	110	109	106	124	96	99	104	112	102	107	102	106
Commodore	H	T*	EU1	95	110	91	103	120	101	105	101	94	96	97	100	102
LG Adamant	H	T*	EU1	101	98	118	108	131	99	104	113	113	103	100	101	106
LG Atkins	H	T*	EU1	96	102	111	109	121	97	99	101	110	101	97	100	103
Heden	H		EU1	105	110	98	107	123	105	107	103	114	98	95	101	106
Hindiana	H		EU1	111	109	108	99	129	90	103	102	109	112	106	108	106
Exantra	H	T*	EU1	93	93	111	95	123	84	99	100	107	106	103	95	99
RGT Eros	H		EU1	99	114	101	105	130	100	121	103	97	108	107	105	108
Mittel				102	103	104	102	118	97	104	103	103	104	99	100	103
Grenzdif.				10	10	9	8	9	10	8	6	7	8	9	9	

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 105: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Marktleistung rel.

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				1780	1901	1064	2034	1597	2442	2399	1894	1610	1198	1791	1830	1795
Ludger(B)	H	T	VRS	108	90	99	99	110	104	101	100	100	95	94	101	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	86	102	105	95	91	106	98	101	100	94	105	98	99
KWS Ambos(B)	H		VRS	106	108	96	106	98	90	101	99	100	111	101	101	101
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	106	102	99	105	97	102	97	99	97	91	90	98
KWS Vamos	H		VGL	112	109	116	114	116	99	107	106	115	114	104	116	110
PT 331	H	K*	EU1	89	95	88	89	108	91	100	91	84	94	94	82	92
Cezanne	H		EU1	105	100	111	102	131	88	105	102	104	112	76	98	102
RGT Keos	H		EU1	96	108	110	103	127	100	106	104	97	114	109	104	106
Hornela	H		EU1	112	89	111	97	112	92	97	102	109	111	93	109	102
Hemma	H		EU1	115	102	112	100	122	91	95	104	105	112	92	99	103
Haaland	H		EU1	109	110	109	104	121	94	95	102	110	100	103	99	104
Commodore	H	T*	EU1	95	112	90	105	122	102	106	102	97	96	97	99	102
LG Adamant	H	T*	EU1	99	98	122	107	130	98	101	112	113	101	96	100	105
LG Atkins	H	T*	EU1	95	100	108	110	120	96	95	101	111	100	95	99	102
Heden	H		EU1	102	106	92	106	120	102	102	100	112	96	90	97	102
Hindiana	H		EU1	110	107	108	97	127	89	100	100	107	111	103	105	104
Exantra	H	T*	EU1	93	92	113	95	123	84	96	98	108	107	100	94	99
RGT Eros	H		EU1	100	114	103	107	132	101	120	104	96	108	107	104	108
Mittel				101	103	104	102	117	96	102	102	103	103	97	99	102

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 106: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Ölertrag rel.

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				17,7	18,8	10,6	20,3	15,8	24,3	23,5	18,8	16,1	11,9	17,9	18,1	17,8
Ludger(B)	H	T	VRS	108	89	99	99	110	104	102	101	100	95	94	100	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	85	102	105	95	91	106	97	101	100	94	105	98	98
KWS Ambos(B)	H		VRS	107	109	96	106	99	90	101	99	100	112	101	102	101
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	108	102	99	106	97	102	97	98	97	90	90	98
KWS Vamos	H		VGL	113	108	118	115	116	99	107	107	115	116	104	116	110
PT 331	H	K*	EU1	88	95	87	88	107	90	99	91	83	93	93	81	91
Cezanne	H		EU1	104	98	110	102	131	88	104	101	103	112	75	97	101
RGT Keos	H		EU1	96	109	111	104	127	100	105	103	97	114	109	104	106
Hornela	H		EU1	110	87	110	95	110	91	94	100	107	110	92	106	100
Hemma	H		EU1	113	100	110	99	121	90	92	103	104	111	90	98	101
Haaland	H		EU1	108	110	107	103	119	93	93	100	108	99	101	97	102
Commodore	H	T*	EU1	95	113	90	106	123	102	106	102	97	96	97	99	103
LG Adamant	H	T*	EU1	97	98	121	107	130	97	98	112	112	100	95	99	105
LG Atkins	H	T*	EU1	93	98	109	110	119	96	94	101	111	99	94	99	101
Heden	H		EU1	99	103	90	105	118	100	100	99	109	94	88	95	100
Hindiana	H		EU1	109	106	106	97	126	88	98	99	106	111	102	104	103
Exantra	H	T*	EU1	93	92	113	95	123	83	95	97	108	107	99	94	98
RGT Eros	H		EU1	100	113	103	107	133	101	121	105	96	108	107	103	108
Mittel				100	102	104	102	117	96	101	101	102	103	96	98	101

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 107: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026

% Öl bei 91 % TS

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 11 Orte
Mittel (B)				44,8	44,1	45,4	45,4	43,8	42,8	44,6	45,4	45,0	45,7	44,2	44,6
Ludger(B)	H	T	VRS	44,8	43,0	45,3	44,6	43,7	43,5	45,1	45,6	44,8	45,7	43,4	44,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	43,8	44,4	45,9	45,5	43,7	42,2	44,2	45,0	44,5	46,0	44,4	44,5
KWS Ambros(B)	H		VRS	45,7	44,9	45,0	46,1	44,1	42,8	44,5	45,6	45,8	45,3	44,9	45,0
LG Baracuda	H	T+K	VGL	44,5	46,0	46,1	46,0	44,8	42,6	44,6	45,3	45,1	44,4	43,2	44,8
KWS Vamos	H		VGL	45,4	43,5	46,5	46,1	44,1	42,2	45,3	45,9	46,5	46,3	44,2	45,1
PT 331	H	K*	EU1	43,5	43,9	44,7	44,1	43,5	41,5	44,1	43,9	44,7	44,7	43,7	43,8
Cezanne	H		EU1	43,9	41,9	43,9	45,8	43,4	41,7	43,1	44,1	44,6	43,8	43,1	43,6
RGT Keos	H		EU1	44,5	44,6	45,6	46,5	44,3	41,1	44,2	45,0	45,4	45,9	44,6	44,7
Hornela	H		EU1	42,2	41,7	43,6	43,5	42,0	39,6	42,2	43,6	44,0	44,0	41,6	42,5
Hemma	H		EU1	42,8	42,2	43,3	43,6	42,3	39,9	43,3	44,4	44,2	43,8	43,1	43,0
Haaland	H		EU1	43,0	43,9	43,5	44,3	42,2	40,3	43,1	43,4	43,9	43,6	42,1	43,0
Commodore	H	T*	EU1	44,6	45,5	45,4	46,9	44,9	43,0	45,4	45,2	45,0	45,5	43,9	45,0
LG Adamant	H	T*	EU1	43,0	44,0	44,6	45,6	43,7	40,4	44,3	44,6	43,9	44,0	43,1	43,7
LG Atkins	H	T*	EU1	43,2	42,6	46,1	46,2	43,4	40,7	44,3	44,9	44,4	44,6	43,6	44,0
Heden	H		EU1	42,1	41,4	42,5	44,4	42,0	40,0	42,5	42,4	43,4	42,6	41,6	42,3
Hindiana	H		EU1	43,5	43,2	43,9	44,8	42,9	40,7	43,3	44,1	44,7	44,4	42,6	43,5
Exantra	H	T*	EU1	44,2	43,6	45,7	45,3	43,8	41,1	43,7	44,6	45,6	44,7	43,8	44,2
RGT Eros	H		EU1	44,7	44,0	45,7	46,5	44,9	43,0	45,2	44,4	44,9	45,2	43,7	44,8
Mittel				43,9	43,7	44,9	45,4	43,5	41,5	44,0	44,5	44,8	44,7	43,4	44,0

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 108: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026

% Protein 91% TS

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 11 Orte
Mittel (B)				16,1	16,4	15,8	15,2	16,3	17,5	16,4	15,7	15,8	14,9	16,9	16,1
Ludger(B)	H	T	VRS	16,3	17,3	15,9	15,7	16,3	16,7	16,3	15,5	15,9	15,0	17,5	16,2
LG Activus(B)	H	T	VRS	16,6	16,3	15,2	15,3	16,4	18,1	16,5	15,9	16,3	14,5	16,8	16,2
KWS Ambos(B)	H		VRS	15,5	15,4	16,2	14,8	16,1	17,6	16,6	15,6	15,2	15,4	16,3	15,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	16,9	14,8	15,0	15,3	15,6	17,9	16,7	15,9	16,3	15,9	18,6	16,3
KWS Vamos	H		VGL	16,1	17,9	15,2	15,1	16,4	18,3	16,6	15,5	15,1	15,0	17,4	16,2
PT 331	H	K*	EU1	18,0	17,6	16,7	17,0	16,8	19,1	18,2	17,3	16,8	16,4	18,5	17,5
Cezanne	H		EU1	15,9	17,8	16,3	13,8	15,9	17,7	17,5	16,0	15,6	15,8	17,6	16,3
RGT Keos	H		EU1	16,4	16,0	16,3	14,6	16,0	18,9	17,3	15,6	16,1	15,1	17,3	16,3
Hornela	H		EU1	16,8	17,8	15,7	15,4	16,1	19,0	17,0	15,9	15,3	15,1	18,0	16,5
Hemma	H		EU1	16,6	17,6	16,7	15,6	16,4	18,9	16,7	15,2	15,4	15,4	16,9	16,5
Haaland	H		EU1	16,6	16,1	16,7	14,8	16,2	18,4	16,9	16,5	15,6	15,6	17,7	16,4
Commodore	H	T*	EU1	16,2	15,8	15,6	13,5	15,7	17,9	16,4	16,0	16,1	15,5	17,4	16,0
LG Adamant	H	T*	EU1	17,0	15,7	15,5	14,4	15,4	18,9	16,1	15,7	16,6	15,6	17,3	16,2
LG Atkins	H	T*	EU1	17,1	17,6	15,1	14,7	16,3	18,9	17,1	16,1	16,3	15,9	17,2	16,6
Heden	H		EU1	18,0	17,8	17,6	15,2	16,8	19,3	17,6	17,8	17,0	17,1	18,8	17,5
Hindiana	H		EU1	16,5	16,8	16,5	15,3	16,3	18,1	17,4	16,0	15,5	15,3	17,7	16,5
Exantra	H	T*	EU1	16,2	16,8	15,3	14,5	15,9	18,6	17,0	16,2	14,6	15,6	17,5	16,2
RGT Eros	H		EU1	16,3	16,4	15,3	14,1	15,4	17,9	16,3	16,3	15,7	15,6	17,8	16,1
Mittel				16,6	16,7	15,9	14,9	16,1	18,3	16,9	16,1	15,8	15,5	17,6	16,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 109: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Glucosinolat (µmol; 91% TS, 40% Öl)

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 11 Orte
Mittel (B)				16,4	17,3	13,6	14,8	14,7	15,2	11,7	14,0	14,9	14,2	16,2	14,8
Ludger(B)	H	T	VRS	18,8	22,0	15,5	19,8	17,0	15,1	13,6	14,6	15,1	15,5	17,4	16,8
LG Activus(B)	H	T	VRS	15,1	16,6	12,6	13,2	13,7	16,1	10,0	14,2	15,1	11,3	15,9	14,0
KWS Ambos(B)	H		VRS	15,2	13,4	12,8	11,2	13,3	14,3	11,5	13,2	14,6	15,9	15,4	13,7
LG Baracuda	H	T+K	VGL	16,4	14,7	11,1	15,1	12,8	15,2	12,2	11,8	14,8	17,2	18,0	14,5
KWS Vamos	H		VGL	15,4	19,0	11,1	12,5	12,5	15,1	12,4	14,6	14,6	16,5	14,7	14,4
PT 331	H	K*	EU1	14,1	12,9	9,4	10,5	11,5	13,7	14,0	10,5	13,1	10,2	12,5	12,0
Cezanne	H		EU1	16,3	15,3	14,5	12,3	17,1	17,9	16,1	14,2	19,7	16,0	15,8	15,9
RGT Keos	H		EU1	12,5	13,1	12,0	7,1	14,7	11,2	13,9	11,7	11,2	13,9	15,3	12,4
Hornela	H		EU1	13,5	17,2	12,4	14,2	15,2	16,8	14,4	13,8	13,2	14,3	15,5	14,6
Hemma	H		EU1	16,3	21,0	15,3	13,3	13,3	16,6	12,8	12,8	12,9	15,8	14,8	15,0
Haaland	H		EU1	18,2	17,6	17,9	14,5	17,7	15,9	18,8	18,3	17,8	18,6	16,3	17,4
Commodore	H	T*	EU1	20,2	14,6	12,2	12,0	15,8	14,6	12,4	12,3	17,9	17,6	16,1	15,1
LG Adamant	H	T*	EU1	17,6	15,4	11,3	13,5	13,8	15,9	14,7	14,4	19,2	18,2	18,7	15,7
LG Atkins	H	T*	EU1	12,9	12,4	13,1	13,4	13,3	13,5	12,9	13,4	15,5	13,8	13,4	13,4
Heden	H		EU1	14,6	14,0	11,0	11,6	14,8	17,0	16,6	14,3	15,2	16,4	15,9	14,7
Hindiana	H		EU1	19,3	16,6	18,9	17,2	18,0	17,4	17,9	17,6	19,2	19,7	21,8	18,5
Exantra	H	T*	EU1	17,5	18,5	14,9	16,1	17,6	19,7	15,6	19,0	16,3	20,3	21,3	17,9
RGT Eros	H		EU1	15,9	11,9	13,9	11,8	10,8	11,7	12,9	14,5	13,3	16,1	16,0	13,5
Mittel				16,1	15,9	13,4	13,1	14,7	15,4	14,1	14,2	15,6	15,8	16,4	15,0

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 110: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Tausendkornmasse bei 91%TS g

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Thüle	Giessen	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 10 Orte
Mittel (B)				5,4	4,5	4,3	4,2	4,0	4,2	4,5	4,8	4,7	4,7	4,6
Ludger(B)	H	T	VRS	5,2	4,2	4,2	4,1	3,9	4,3	4,2	4,8	4,4	4,3	4,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	5,9	4,9	4,9	4,9	4,1	4,7	5,1	5,2	5,1	5,3	5,0
KWS Ambros(B)	H		VRS	5,1	4,5	3,9	3,8	4,0	3,7	4,3	4,5	4,6	4,4	4,3
LG Baracuda	H	T+K	VGL	5,6	4,8	4,3	4,2	4,4	4,2	4,9	5,2	5,2	4,6	4,7
KWS Vamos	H		VGL	5,3	4,2	4,1	4,3	4,0	4,2	4,5	4,9	4,8	4,6	4,5
PT 331	H	K*	EU1	5,1	4,0	3,9	3,9	3,6	4,1	4,0	4,4	4,2	4,0	4,1
Cezanne	H		EU1	5,3	4,1	3,8	3,9	4,2	4,2	4,2	4,5	4,6	4,4	4,3
RGT Keos	H		EU1	5,1	4,0	3,7	3,8	4,0	4,0	4,0	4,6	4,4	4,0	4,2
Hornela	H		EU1	5,6	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,8	4,9	4,6	4,5
Hemma	H		EU1	5,7	4,6	4,5	4,5	4,4	4,6	4,8	5,0	5,1	4,6	4,8
Haaland	H		EU1	6,0	4,4	4,3	4,2	4,2	4,8	4,5	5,0	5,2	4,5	4,7
Commodore	H	T*	EU1	4,9	3,9	3,3	3,7	4,0	3,8	3,8	4,4	4,4	3,9	4,0
LG Adamant	H	T*	EU1	5,4	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	4,8	5,0	4,6	4,4
LG Atkins	H	T*	EU1	5,6	4,3	4,2	4,1	4,2	4,4	4,4	5,0	5,1	4,7	4,6
Heden	H		EU1	5,7	4,8	4,3	4,4	4,2	4,5	4,6	4,9	5,2	4,8	4,7
Hindiana	H		EU1	5,4	4,5	4,4	4,7	4,0	4,1	4,5	4,7	4,8	4,3	4,5
Exantra	H	T*	EU1	5,0	4,3	3,7	3,9	4,1	3,8	4,3	4,4	4,5	4,2	4,2
RGT Eros	H		EU1	5,2	4,2	3,8	4,0	4,0	4,2	4,1	4,5	4,6	4,3	4,3
Mittel				5,4	4,3	4,1	4,1	4,1	4,2	4,4	4,7	4,8	4,4	4,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 111: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Mängel vor Winter

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				2,9	3,3	4,7	1,0	1,0	1,7	1,7	1,0	1,7	3,2	3,0	1,3	2,2
Ludger(B)	H	T	VRS	2,3	2,8	4,7	1,0	1,0	2,3	2,0	1,0	2,0	3,3	3,3	1,3	2,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,3	4,3	5,3	1,0	1,0	1,5	1,7	1,0	2,0	3,3	3,3	1,3	2,4
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,0	2,8	4,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0	3,0	2,3	1,3	1,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,0	3,3	4,7	1,0	1,0	2,0	2,7	1,0	1,8	3,7	3,0	1,7	2,4
KWS Vamos	H		VGL	3,5	4,8	5,7	1,0	1,0	1,7	2,0	1,0	2,0	2,7	2,7	1,0	2,4
PT 331	H	K*	EU1	2,8	3,3	4,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,3	3,0	3,3	1,3	2,2
Cezanne	H		EU1	3,0	3,3	4,7	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	1,8	3,3	3,3	1,3	2,2
RGT Keos	H		EU1	2,8	4,0	4,7	1,0	1,0	1,7	2,7	1,0	2,3	3,3	3,0	1,3	2,4
Hornela	H		EU1	3,5	3,8	5,3	1,0	1,0	1,7	1,7	1,0	1,8	3,3	4,0	1,0	2,4
Hemma	H		EU1	2,8	3,5	4,7	1,0	1,0	1,0	1,7	1,0	2,0	2,7	2,7	1,0	2,1
Haaland	H		EU1	2,8	3,3	5,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,3	2,7	3,7	1,3	2,3
Commodore	H	T*	EU1	2,8	2,8	4,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,5	3,0	3,3	1,0	2,1
LG Adamant	H	T*	EU1	2,3	3,5	5,0	1,0	1,0	1,0	1,7	1,0	2,3	2,7	3,3	1,3	2,2
LG Atkins	H	T*	EU1	2,8	4,0	4,7	1,0	1,0	1,7	2,0	1,0	1,8	2,7	2,3	1,0	2,2
Heden	H		EU1	3,3	3,3	5,3	1,0	1,0	1,3	2,7	1,0	2,3	3,3	2,7	1,3	2,4
Hindiana	H		EU1	2,5	3,0	4,7	1,0	1,0	1,3	2,0	1,0	1,8	3,0	2,7	1,3	2,1
Exantra	H	T*	EU1	2,5	3,5	4,7	1,0	1,0	1,5	1,3	1,0	2,0	2,7	2,7	1,3	2,1
RGT Eros	H		EU1	2,8	3,3	5,0	1,3	1,0	1,7	2,7	1,0	2,0	3,7	3,3	1,3	2,4
Mittel				2,9	3,5	4,8	1,0	1,0	1,5	1,9	1,0	2,0	3,1	3,1	1,3	2,2

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 112: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Mängel nach Winter

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				3,0	3,2	4,4	2,2	1,0	1,4	1,9	1,0	1,7	3,1	4,0	1,0	2,3
Ludger(B)	H	T	VRS	3,0	2,8	5,7	2,3	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	3,0	5,0	1,0	2,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,0	4,0	5,0	2,5	1,0	1,5	1,7	1,0	2,0	3,3	4,0	1,0	2,5
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,0	2,8	2,7	1,8	1,0	1,0	2,3	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,0
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,8	3,3	3,7	1,7	1,0	2,0	2,3	1,0	1,8	3,0	3,7	1,0	2,3
KWS Vamos	H		VGL	3,0	4,8	5,7	2,0	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	3,0	3,7	1,0	2,5
PT 331	H	K*	EU1	3,0	3,0	3,7	1,5	1,0	1,3	2,0	1,0	2,3	3,0	4,7	1,0	2,3
Cezanne	H		EU1	3,0	2,8	5,0	1,3	1,0	1,7	2,3	1,0	1,8	3,0	4,0	1,0	2,3
RGT Keos	H		EU1	3,0	3,5	5,0	2,0	1,0	1,7	2,3	1,0	2,3	3,0	3,7	1,0	2,5
Hornela	H		EU1	3,0	3,8	4,3	1,3	1,0	2,0	2,7	1,0	1,8	3,0	5,7	1,0	2,5
Hemma	H		EU1	3,0	3,5	4,7	1,8	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	3,0	4,7	1,0	2,4
Haaland	H		EU1	3,0	3,0	5,3	1,8	1,0	1,3	2,3	1,0	2,3	3,0	4,7	1,0	2,5
Commodore	H	T*	EU1	2,8	2,8	3,7	2,3	1,0	1,3	2,3	1,0	2,5	3,0	4,3	1,0	2,3
LG Adamant	H	T*	EU1	3,0	3,3	5,3	2,3	1,0	1,0	2,7	1,0	2,3	3,0	4,3	1,0	2,5
LG Atkins	H	T*	EU1	2,8	4,0	3,7	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,8	3,3	3,7	1,0	2,3
Heden	H		EU1	3,3	3,3	5,7	1,8	1,0	1,3	2,3	1,0	2,3	3,0	4,3	1,0	2,5
Hindiana	H		EU1	3,0	2,8	3,7	2,3	1,0	1,7	2,3	1,0	1,8	2,7	3,7	1,0	2,2
Exantra	H	T*	EU1	2,8	3,5	3,7	2,0	1,0	1,0	2,7	1,0	2,0	3,0	4,0	1,0	2,3
RGT Eros	H		EU1	2,8	3,3	4,0	2,0	1,0	1,7	2,0	1,0	2,0	3,0	3,7	1,0	2,3
Mittel				2,9	3,3	4,4	1,9	1,0	1,6	2,2	1,0	2,0	3,0	4,2	1,0	2,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 113: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026

Pflanzenlänge cm

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giesen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 12 Orte
Mittel (B)				145	176	129	164	147	169	164	152	139	127	117	139	147
Ludger(B)	H	T	VRS	146	171	126	162	146	165	162	149	136	125	115	140	145
LG Activus(B)	H	T	VRS	134	174	128	158	144	160	154	145	131	122	113	132	141
KWS Ambos(B)	H		VRS	154	183	133	173	152	182	177	161	149	133	122	144	155
LG Baracuda	H	T+K	VGL	143	184	136	168	163	165	172	158	138	128	127	140	152
KWS Vamos	H		VGL	149	183	125	173	157	170	172	159	143	132	118	148	152
PT 331	H	K*	EU1	157	204	139	184	167	192	177	164	159	150	127	153	164
Cezanne	H		EU1	152	196	142	182	156	195	181	164	149	142	123	151	161
RGT Keos	H		EU1	150	186	126	173	154	177	171	158	146	135	128	150	154
Hornela	H		EU1	155	194	142	182	168	187	176	159	156	143	132	152	162
Hemma	H		EU1	155	194	135	180	161	186	173	160	152	137	123	155	159
Haaland	H		EU1	152	199	133	179	160	177	172	156	147	132	130	148	157
Commodore	H	T*	EU1	149	185	132	170	153	165	171	154	139	128	122	144	151
LG Adamant	H	T*	EU1	145	189	142	181	159	174	173	158	148	128	127	151	156
LG Atkins	H	T*	EU1	138	175	140	168	150	168	163	146	136	127	120	141	148
Heden	H		EU1	154	194	139	184	157	183	171	158	149	132	123	147	157
Hindiana	H		EU1	159	198	147	181	160	183	173	161	153	140	122	155	161
Exantra	H	T*	EU1	153	198	143	186	160	195	180	165	155	142	133	157	164
RGT Eros	H		EU1	154	196	139	179	163	179	181	166	145	138	132	149	160
Mittel				150	188	136	175	157	177	172	158	146	134	124	147	155

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 114: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Lager bei Reife

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Thüle	Malchow	Mittel 3 Orte
Mittel (B)				3,8	3,0	1,3	2,7
Ludger(B)	H	T	VRS	3,8	2,7	1,0	2,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,0	1,8	1,0	1,9
KWS Ambos(B)	H		VRS	4,8	4,5	2,0	3,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,3	3,3	1,0	2,5
KWS Vamos	H		VGL	3,5	4,3	1,0	2,9
PT 331	H	K*	EU1	3,0	1,5	1,0	1,8
Cezanne	H		EU1	4,5	3,7	1,0	3,1
RGT Keos	H		EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
Hornela	H		EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
Hemma	H		EU1	3,8	2,8	1,0	2,5
Haaland	H		EU1	3,3	2,0	1,0	2,1
Commodore	H	T*	EU1	3,5	2,3	1,0	2,3
LG Adamant	H	T*	EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
LG Atkins	H	T*	EU1	3,3	1,8	1,0	2,0
Heden	H		EU1	3,0	3,0	1,0	2,3
Hindiana	H		EU1	3,3	2,0	1,0	2,1
Exantra	H	T*	EU1	4,3	2,5	1,0	2,6
RGT Eros	H		EU1	3,8	3,0	1,0	2,6
Mittel				3,5	2,6	1,1	2,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 115: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Lager vor Ernte

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Wehnen	Thüle	Mittel 3 Orte
Mittel (B)				3,1	2,0	3,3	2,8
Ludger(B)	H	T	VRS	3,3	2,0	3,0	2,8
LG Activus(B)	H	T	VRS	2,5	2,0	1,8	2,1
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,5	2,0	5,0	3,5
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,8	2,0	3,3	2,7
KWS Vamos	H		VGL	2,5	2,0	4,5	3,0
PT 331	H	K*	EU1	2,0	2,0	1,5	1,8
Cezanne	H		EU1	3,5	2,0	3,7	3,1
RGT Keos	H		EU1	2,3	2,0	2,3	2,2
Hornela	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Hemma	H		EU1	2,3	2,0	2,8	2,3
Haaland	H		EU1	2,5	2,0	2,0	2,2
Commodore	H	T*	EU1	2,3	2,0	2,3	2,2
LG Adamant	H	T*	EU1	2,5	2,0	2,3	2,3
LG Atkins	H	T*	EU1	2,0	2,0	1,8	1,9
Heden	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Hindiana	H		EU1	2,3	2,0	2,0	2,1
Exantra	H	T*	EU1	2,8	2,0	3,5	2,8
RGT Eros	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Mittel				2,5	2,0	2,7	2,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 116: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 04.08.2026
Reifeverzögerung Stroh

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Düllstadt	Malchow	Leutewitz	Mittel 4 Orte
Mittel (B)				3,0	2,9	5,8	4,9	4,2
Ludger(B)	H	T	VRS	2,0	2,7	6,0	5,3	4,0
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,8	2,3	6,8	5,3	4,5
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,3	3,7	4,8	4,0	3,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,0	3,0	6,0	5,0	4,3
KWS Vamos	H		VGL	4,3	4,0	5,8	5,3	4,8
PT 331	H	K*	EU1	4,8	1,7	8,0	6,3	5,2
Cezanne	H		EU1	3,5	3,7	6,0	6,0	4,8
RGT Keos	H		EU1	4,0	3,7	5,8	6,0	4,9
Hornela	H		EU1	3,5	3,0	6,3	4,3	4,3
Hemma	H		EU1	3,5	3,3	6,0	4,3	4,3
Haaland	H		EU1	3,8	3,3	6,8	5,0	4,7
Commodore	H	T*	EU1	5,3	3,0	7,5	5,7	5,4
LG Adamant	H	T*	EU1	3,3	2,0	6,8	5,0	4,3
LG Atkins	H	T*	EU1	4,3	4,0	7,0	7,0	5,6
Heden	H		EU1	4,3	2,7	6,8	4,7	4,6
Hindiana	H		EU1	3,8	3,3	6,0	3,3	4,1
Exantra	H	T*	EU1	2,8	4,0	4,5	3,3	3,6
RGT Eros	H		EU1	5,5	3,7	6,8	6,7	5,6
Mittel				3,8	3,2	6,4	5,3	4,7

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP