

Zweite Auswertung

Der EU-Sortenversuch 1. Prüffahr wurde bundesweit im Zeitraum vom 21.08. – 08.09.2025 bei regional trockenen Böden ausgesät. In der Regel gelang es dennoch, dass Saatgut in eine ausreichend feuchte Bodenschicht zu legen oder Regen setzte rechtzeitig ein, sodass ausreichende bis gute Bestandsdichten erreicht wurden. In Hohenschulen, Sonnewalde und vor allem Leutewitz flogen Rapserrdföhe stark bis sehr stark zu. Der Winter verlief zunächst mild, wurde zu Ende hin jedoch kalt mit teils stärkeren Frösten. An den meisten Standorten waren die Bestände durch eine Schneeauflage geschützt, sodass keine Pflanzenverluste verzeichnet wurden und die Blattverluste moderat blieben. Vereinzelt wurde im Herbst Blattphoma festgestellt. Die Vegetation startete zunächst früh, wurde aber im März und April aufgrund kühler Witterung teils mit Nachfrösten bei zugleich hoher Sonneneinstrahlung gebremst. Ende April/Anfang Mai erwärmte es sich langsam und begünstigte an einigen Standorten eine lange Blüte. An der Mehrheit der Standorte verlief das Frühjahr trocken und die Bestände blieben meist kurz. Durch nachfolgende Hitze ab Mitte Juni setzte die Reife abrupt ein und in Gießen, Düllstadt, Moosburg und Leutewitz wurde der Raps bereits zwischen dem 10.-13.Juli geerntet. Insgesamt traten witterungsbedingt Lager und Krankheiten auch in 2026 kaum auf, sodass die Datengrundlage für eine Sortenbeschreibung in der Lager- und Krankheitsanfälligkeit unzureichend ist.

Alle Versuche wurden bis zur Ernte geführt und mit Stand vom 07.09.2026 lagen somit für den Ertrag, die Qualität und alle weiteren Merkmale die Ergebnisse von 15 Standorten vor.

Der Versuch am Standort **Futterkamp** zeigte sich die gesamte Vegetation über mit erheblich Mängeln, was sich in einer erhöhten Grenzdifferenz der Ertragsergebnisse widerspiegelt. Allgemein weist die Prüfung eine unzureichende Versuchsgenauigkeit auf, sodass die Versuchsergebnisse gesamt aus der Serienwertung ausgeschlossen werden. Auf eine Analyse der Ernteproben vom Standort Futterkamp wurde verzichtet. Der Versuch am Standort Ihinger Hof präsentierte sich nach dem Winter gleichmäßig und vital. Nach einem trockenen Frühjahr verlief der Sommer heiß und trocken und führte zu einer vorzeitigen Abreife. Bei einem rel. geringen Ertragsniveau zeigten die Ergebnisse eine hohe Streuung. Die Ergebnisse vom **Ihinger Hof** fließen daher nicht in die Auswertung ein.

In die vorliegende Auswertung gingen somit die Ergebnisse von 13 Standorten.

Die GSL-Gehalte wurden auf 91 % TS und auf 40 % Öl berechnet. Die Phoma-Befallswerte für die Indikatortypen Ludger an den Standorten sind in der Tab. 1 eingetragen. An keinem der Prüfstandorte wurde bei der Phomazeigersorte Ludger der Mindestbefall von 3,0 erreicht, sodass keine Ergebnisse der Phoma-Einzelpflanzen-Bonitur des gesamten Sortiments vorliegen.

Für die EU-Sorte Crown konnte die Sortenidentität durch das Bundessortenamt nicht bestätigt werden, sodass die Ergebnisse dieser Sorte nicht veröffentlicht werden. Für alle weiteren Prüfsorten hat das Bundessortenamt die Sortenidentität des für den EUSV 1 vorgelegten Saatgutes bestätigt.

Für die Bonituren zu „Lager nach Blüte“, „Lager bei Reife“ und „Lager bei Ernte“ wurden nur Versuche in die Mittelwertbildung einbezogen, an denen eine Differenzierung in der Standfestigkeit vorhanden war. In Sonnewalde erhielten alle Parzellen für Lager vor der Ernte einheitlich die Note 9. Aufgrund der fehlenden Differenzierung wurden diese Daten nicht in die Auswertung übernommen.

Für die Berechnung der Marktleistung wurde in Abstimmung mit den Ländern eine einheitliche Berechnungsformel eingeführt. Die Änderungen zu der bisher verwendeten Formel bestehen darin, dass ab Ernte 2026 die Berechnung der Marktleistung mittels der Rohdaten (Kornertrag pro Parzelle in kg, Trockensubstanz (Korn) in %) erfolgt und nicht mehr mittels der berechneten Kornertrages (Kornertrag bei 91 % TS). Ebenfalls fällt die Korrektur des Parzellenertrages um abzüglich 15 % weg und auch die Mehrwertsteuer

von 10,7 % wird nicht mehr einbezogen. Es wurde sich zudem auf einen mehrjährigen Marktpreis von 42.- EUR/dt zwischen den Ländern geeinigt.

Angaben zur Parzellenform und zur Versuchsdurchführung sind in Tabelle 2 dargestellt.

Diese Ergebnisse können für Beratung und Veröffentlichungen verwendet werden, sind aber unbedingt als „vorläufige Ergebnisse“ zu kennzeichnen.

Tabelle 1: Versuchsstandorte und Ergebnislage mit Stand 09.09.2026:

lfd. Nr.	Standort	BL	Druscher- gebnis	Ölgehalt	Fungizid	Fungizid	Phoma Ludger
					Herbst	Frühjahr	
1	Hohenschulen	SH	ja	ja	-	-	1,88
2	Futterkamp	SH	ja, n. E.	n. a.	-	-	2,16
3	Otterham	NI	ja	ja	n.R.	-	1,84
4	Wehnen	NI	ja	ja	-	-	1,81
5	Thüle	NRW	ja	ja	-	-	2,70
6	Gießen	HE	ja	ja	-	-	2,74
7	Idstein	HE	ja	ja	-	-	1,27
8	Ihinger Hof	BW	ja, n. E.	ja, n. E.	-	-	1,74
9	Düllstadt	BY	ja	ja	-	-	1,76
10	Moosburg	BY	ja	ja	-	-	3,07
11	Malchow	MV	ja	ja	-	-	1,44
12	Klein Bünzow	MV	ja	ja	-	-	-
13	Sonnewalde	BB	ja	ja	-	-	2,12
14	Gebstedt	ST	ja	ja	-	-	1,44
15	Leutewitz	SN	ja	ja	-	-	2,21

Es bedeuten: Soko = Entscheidung durch Sortenkommission; n.E. = nicht in Endauswertung;
n. b. = nicht analysiert, n. R. = nach Rücksprache

Verrechnungssorten: 100 rel. = Mittel über Ludger, LG Activus, KWS Ambos

Der Kornertrag ist jeweils absolut (dt/ha bei 91% TS) und relativ angegeben. Marktleistung und Ölertrag sind nur relativ angegeben. Grenzdifferenzen wurden mit dem t-Test berechnet.

Folgende mehrortige Auswertungen wurden am 09.09.2026 erstellt:

Ausw. 201: alle Merkmale im Mittel über alle Standorte, Teil 1
Ausw. 202: alle Merkmale im Mittel über alle Standorte, Teil 2
Ausw. 203: Kornertrag dt/ha über 13 Orte
Ausw. 204: Kornertrag rel. über 13 Orte
Ausw. 205: Marktleistung rel. über 13 Orte
Ausw. 206: Ölertrag rel. über 13 Orte
Ausw. 207: Ölgehalt (%) über 13 Orte
Ausw. 208: Proteingehalt (%) über 13 Orte
Ausw. 209: GSL-Gehalt (μmol) über 13 Orte
Ausw. 210: Tausendkornmasse (g) über 13 Orte
Ausw. 211: Mängel vor Winter über 13 Orte
Ausw. 212: Mängel nach Winter über 13 Orte
Ausw. 213: Pflanzenlänge (cm) über 13 Orte
Ausw. 214: Lager bei Reife über 3 Orte
Ausw. 215: Lager vor Ernte über 3 Orte
Ausw. 216: Reifeverzögerung des Strohs über 4 Orte

Rendsburg, den 09.09.2026

J. Gronow-Ehlers

L. Paustian-Lucht

Dr. C. Kleimeier

EUSV 1 Winterraps 2026 - Parzellenform, Saatstärke und S-Düngung der Standorte

Nr	Standort	Par- zelle ¹⁾	An- zahl	Ernteparzelle		Steg- breite	Reihen- weite	Saatstärke K/m ²	Aussaat	gepflügt	S-Früh- jahr kg/ha
		PiP	Wdh.	L x B [m]	m ²	cm	cm		Datum		
1	Hohenschulen	x	4	11,0 x 1,4	15,4	40	28	50	18.08.2025	ja	40,0
2	Futterkamp	x	3	8,0 x 1,5	12,0	k. A.	25	45	21.08.2025	nein	48,7
3	Otterham	x	4	7,0 x 1,8	12,6	50	24	40	23.08.2025	ja	40,4
4	Wehnen	x	3	6,7 x 1,8	12,06	50	25	50	03.09.2025	ja	70,7
5	Thüle	x	4	5,77 x 2,0	11,54	50	20	50	29.08.2025	ja	44,0
6	Gießen	x	4	8,0 x 1,5	12,0	k. A.	25	50	04.09.2025	ja	25,0
7	Idstein	x	3	8,5 x 1,5	12,75	50	15	50	08.09.2025	nein	69,6
8	Ihinger Hof	x	4	8,0 x 1,625	13,0	k. A.	25	55	25.08.2025	nein	40,0
9	Düllstadt	x	3	9,0 x 1,5	13,5	45	25	50	01.09.2025	ja	k. A.
10	Moosburg	x	4	6,0 x 1,7	10,2	28	56	50	26.08.2025	ja	102,0
11	Klein Bünzow	x	3	9,0 x 1,3	11,7	28	28	50	04.09.2025	nein	-
12	Malchow	x	4	7,0 x 1,7	11,9	60	28,5	50	27.08.2025	nein	40,2
13	Sonnenwalde	x	3	9,0 x 1,5	13,5	52	28	50	27.08.2025	nein	38,0
14	Gebstedt	x	3	7,5 x 1,5	11,25	52	28	50	22.08.2025	nein	-
15	Leutewitz	x	3	6,75 x 1,93	13,03	60	20	50	03.09.2025	ja	60

¹⁾ DP = Doppelparzelle, PiP = Plot in Plot

Auswertung 201: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Standorte (Teil 1)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Korntrag dt/ha	Korntrag rel.	Marktleistung rel.	Ölertrag rel.	% Öl bei 91 % TS	% Protein 91% TS	% Rohprotein im fettfreien Samen	Glucosinolat (µmol; 91% TS, 40% Öl)	TKM 91%TS g	Datum Aufgang	Datum Blühbeginn	Datum Blühende	Datum Reife
N				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9
Mittel (B)				39,5	39,5	1775	17,6	44,7	16,0	29,0	15,0	4,7				
Ludger(B)	H	T	VRS	39,3	100	100	100	44,5	16,3	29,3	16,6	4,5	04.10.2025	21.04.2026	19.05.2026	03.07.2026
LG Activus(B)	H	T	VRS	39,0	99	98	98	44,6	16,1	29,0	14,5	5,1	04.10.2025	20.04.2026	19.05.2026	03.07.2026
KWS Ambos(B)	H		VRS	40,1	102	102	102	45,1	15,8	28,7	13,8	4,4	04.10.2025	20.04.2026	19.05.2026	02.07.2026
LG Baracuda	H	T+K	VGL	38,5	97	98	98	44,8	16,2	29,4	14,5	4,9	04.10.2025	19.04.2026	19.05.2026	03.07.2026
KWS Vamos	H		VGL	43,0	109	109	110	45,1	16,2	29,5	14,9	4,6	04.10.2025	19.04.2026	19.05.2026	02.07.2026
PT 331	H	K*	EU1	36,6	93	92	91	43,9	17,5	31,1	12,7	4,3	04.10.2025	25.04.2026	22.05.2026	03.07.2026
Cezanne	H		EU1	40,5	102	101	100	43,6	16,3	28,9	16,1	4,5	04.10.2025	23.04.2026	22.05.2026	03.07.2026
RGT Keos	H		EU1	41,7	106	106	106	44,7	16,3	29,6	12,7	4,3	04.10.2025	24.04.2026	21.05.2026	03.07.2026
Hornela	H		EU1	41,3	105	101	99	42,6	16,5	28,8	14,9	4,6	04.10.2025	22.04.2026	21.05.2026	03.07.2026
Hemma	H		EU1	41,4	105	103	101	43,0	16,4	28,8	15,2	4,9	04.10.2025	23.04.2026	21.05.2026	04.07.2026
Haaland	H		EU1	41,5	105	103	102	43,1	16,4	28,7	17,8	4,9	04.10.2025	22.04.2026	22.05.2026	04.07.2026
Commodore	H	T*	EU1	39,7	101	101	102	45,1	15,9	29,0	15,4	4,1	04.10.2025	20.04.2026	20.05.2026	02.07.2026
LG Adamant	H	T*	EU1	41,6	105	104	104	43,8	16,2	28,7	15,9	4,6	04.10.2025	21.04.2026	20.05.2026	03.07.2026
LG Atkins	H	T*	EU1	40,5	103	101	101	44,1	16,6	29,6	13,5	4,7	04.10.2025	22.04.2026	21.05.2026	03.07.2026
Heden	H		EU1	41,4	105	101	99	42,5	17,4	30,2	14,9	4,9	04.10.2025	22.04.2026	21.05.2026	03.07.2026
Hindiana	H		EU1	41,9	106	104	103	43,6	16,4	29,1	18,6	4,7	04.10.2025	23.04.2026	21.05.2026	03.07.2026
Exantra	H	T*	EU1	38,8	98	97	97	44,1	16,2	29,0	17,9	4,4	04.10.2025	23.04.2026	22.05.2026	03.07.2026
RGT Eros	H		EU1	42,0	107	107	107	44,7	16,1	29,1	14,0	4,4	04.10.2025	21.04.2026	21.05.2026	02.07.2026
Mittel				40,4	102	101	101	44,1	16,4	29,3	15,2	4,6	04.10.2025	21.04.2026	20.05.2026	02.07.2026

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 202: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
alle Merkmale im Mittel über alle Standorte (Teil 2)

Sorte	Typ	E ¹⁾	Prüf- status	Aufgang Tage nach 1.1.	Blühbeginn Tage nach 1.1.	Blühende Tage nach 1.1.	Blühdauer (Tage)	Reife Tage nach 1.1.	Mängel nach Aufgang 1-9	Mängel vor Winter 1-9	Mängel nach Winter 1-9	Dif. v/n Winter	Mängel bei Blühbeginn 1-9	Mängel vor Reife 1-9	Mängel Ernte 1-9	Massenb.v.W. 1-9	Entw. v. Winter	Stängelbildung bis Vegetationsbeginn	Pflanzenlänge cm	Lager nach Blüte 1-9	Lager bei Reife 1-9	Lager vor Ernte 1-9	Reifvz.Stroh 1-9	Auswinterung 1-9	Sclerotinia 1-9
N				13	13	13	13	9	12	13	13	13	9	6	1	2	10	7	13	1	3	3	4	2	2
Mittel (B)				277	110	139	29	184	1,8	2,2	2,4	-0,2	1,5	1,3	1,0	6,5	5,8	1,4	144	1,9	2,7	2,8	4,2	3,0	2,4
Ludger(B)	H	T	VRS	277	111	139	28	184	1,8	2,3	2,6	-0,3	1,6	1,3	1,0	6,8	5,9	1,5	142	1,3	2,5	2,8	4,0	3,0	2,4
LG Activus(B)	H	T	VRS	277	110	139	29	184	2,0	2,4	2,5	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,1	5,6	1,3	138	1,0	1,9	2,1	4,5	3,2	2,3
KWS Ambos(B)	H		VRS	277	110	139	29	183	1,6	1,9	2,0	-0,1	1,3	1,2	1,0	6,6	5,8	1,5	152	3,3	3,8	3,5	3,9	2,8	2,6
LG Baracuda	H	T+K	VGL	277	109	139	29	184	1,9	2,4	2,4	0,0	1,5	1,3	1,0	6,5	5,8	1,4	148	1,3	2,5	2,7	4,3	2,3	2,4
KWS Vamos	H		VGL	277	109	139	30	183	1,9	2,4	2,6	-0,2	1,6	1,3	1,0	6,5	5,8	1,5	149	2,0	2,9	3,0	4,8	2,4	2,0
PT 331	H	K*	EU1	277	115	142	27	184	1,8	2,2	2,4	-0,2	1,7	1,4	1,0	6,9	6,0	1,5	161	1,0	1,8	1,8	5,2	3,5	1,6
Cezanne	H		EU1	277	113	142	30	184	1,8	2,2	2,4	-0,2	1,6	1,3	1,0	6,7	6,0	1,4	157	2,7	3,1	3,1	4,8	2,8	2,5
RGT Keos	H		EU1	277	114	141	27	184	1,8	2,4	2,5	-0,2	1,6	1,4	1,0	6,2	5,8	1,5	152	1,3	2,1	2,2	4,9	2,6	1,6
Hornela	H		EU1	277	112	141	29	184	1,9	2,4	2,6	-0,2	1,9	1,3	1,0	7,2	6,0	1,4	159	1,7	2,1	2,3	4,3	2,7	2,0
Hemma	H		EU1	277	113	141	28	185	1,7	2,1	2,5	-0,4	1,7	1,3	1,0	7,0	6,0	1,5	156	1,5	2,5	2,3	4,3	2,5	2,0
Haaland	H		EU1	277	112	142	30	185	1,7	2,3	2,5	-0,2	1,7	1,4	1,0	6,7	6,0	1,5	154	1,0	2,1	2,2	4,7	3,0	1,6
Commodore	H	T*	EU1	277	110	140	30	183	1,6	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,4	1,0	7,1	6,1	1,3	148	1,3	2,3	2,2	5,4	2,9	2,1
LG Adamant	H	T*	EU1	277	111	140	29	184	1,8	2,2	2,5	-0,4	1,7	1,4	1,0	7,3	6,1	1,5	153	1,0	2,1	2,3	4,3	2,3	2,1
LG Atkins	H	T*	EU1	277	112	141	29	184	1,9	2,1	2,5	-0,3	1,7	1,3	1,0	6,1	5,7	1,3	145	1,0	2,0	1,9	5,6	2,7	1,6
Heden	H		EU1	277	112	141	29	184	1,9	2,4	2,6	-0,2	1,7	1,4	1,0	6,5	5,8	1,5	154	1,3	2,3	2,3	4,6	2,7	2,0
Hindiana	H		EU1	277	113	141	28	184	1,6	2,1	2,2	-0,1	1,6	1,3	1,0	6,7	5,8	1,4	158	1,0	2,1	2,1	4,1	2,5	2,0
Exantra	H	T*	EU1	277	113	142	29	184	1,8	2,1	2,5	-0,4	1,6	1,3	1,0	6,8	5,9	1,4	160	1,3	2,6	2,8	3,6	2,4	2,3
RGT Eros	H		EU1	277	111	141	29	183	1,8	2,4	2,4	0,0	1,5	1,3	1,0	6,4	6,0	1,4	157	2,5	2,6	2,3	5,6	2,8	1,6
Mittel				277	111	140	29	183	1,8	2,3	2,5	-0,2	1,6	1,3	1,0	6,7	5,9	1,4	152	1,5	2,4	2,4	4,7	2,7	2,0

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Globale Bezugsbasis

Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 203: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Kornertrag dt/ha

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				39,7	42,6	23,6	44,7	36,0	54,5	54,3	42,1	35,9	33,2	26,5	39,1	41,0	39,5
Ludger(B)	H	T	VRS	43,1	39,0	22,5	44,5	39,7	56,7	54,0	42,1	35,8	30,2	25,2	36,5	41,9	39,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	34,4	43,2	24,6	42,7	32,9	58,3	53,7	42,6	35,8	32,8	25,2	41,3	39,9	39,0
KWS Ambos(B)	H		VRS	41,7	45,7	23,8	46,8	35,3	48,6	55,1	41,6	36,2	36,6	29,1	39,5	41,2	40,1
LG Baracuda	H	T+K	VGL	37,9	44,0	23,2	44,2	37,1	52,5	55,8	41,2	35,4	29,0	25,7	36,5	37,6	38,5
KWS Vamos	H		VGL	43,9	46,8	27,5	50,4	41,6	53,4	59,2	44,3	40,2	34,2	29,6	40,9	47,7	43,0
PT 331	H	K*	EU1	35,9	40,5	20,1	40,4	39,0	50,0	55,9	39,2	29,8	29,0	25,0	37,0	33,7	36,6
Cezanne	H		EU1	41,7	43,9	26,8	45,7	47,6	48,8	58,4	44,2	37,7	29,7	30,0	30,9	40,9	40,5
RGT Keos	H		EU1	38,4	45,8	26,0	45,6	45,3	54,4	59,4	44,0	34,5	33,8	30,1	42,8	42,4	41,7
Hornela	H		EU1	45,9	39,1	26,5	44,2	41,3	51,8	55,0	44,6	40,3	34,8	29,9	37,2	46,3	41,3
Hemma	H		EU1	46,9	44,6	26,0	46,0	45,0	50,9	53,4	44,5	37,6	35,0	29,9	37,1	41,1	41,4
Haaland	H		EU1	44,2	46,9	25,7	47,3	44,6	52,5	54,0	43,8	40,1	30,4	27,0	41,9	41,7	41,5
Commodore	H	T*	EU1	37,7	46,8	21,6	46,0	43,2	55,2	57,3	42,5	33,9	27,6	25,5	37,9	40,9	39,7
LG Adamant	H	T*	EU1	40,3	41,6	27,8	48,0	47,0	54,0	56,3	47,4	40,6	30,2	27,3	39,2	41,5	41,6
LG Atkins	H	T*	EU1	38,1	43,5	26,2	48,6	43,4	52,7	53,5	42,6	39,7	32,5	26,6	37,7	41,1	40,5
Heden	H		EU1	41,7	46,8	23,3	48,0	44,4	57,2	58,0	43,5	41,1	29,8	25,9	37,0	41,3	41,4
Hindiana	H		EU1	44,3	46,4	25,5	44,0	46,4	49,2	55,8	43,0	39,1	36,2	29,6	41,5	44,2	41,9
Exantra	H	T*	EU1	37,1	39,6	26,2	42,4	44,1	46,0	53,7	42,0	38,4	28,2	28,0	40,2	38,9	38,8
RGT Eros	H		EU1	39,2	48,5	23,9	47,0	46,9	54,7	65,4	43,5	35,0	28,8	28,7	41,9	42,9	42,0
Mittel				40,3	44,1	24,6	45,5	42,3	52,8	56,3	43,2	37,0	31,4	27,5	38,6	41,2	40,4
Grenzdif.				3,9	4,3	2,2	3,4	3,4	5,7	4,4	2,4	2,4	2,7	2,1	3,3	3,7	-

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 204: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Kornertrag rel.

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Idstein	Dillstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				39,7	42,6	23,6	44,7	36,0	54,5	54,3	42,1	35,9	33,2	26,5	39,1	41,0	39,5
Ludger(B)	H	T	VRS	108	91	95	100	110	104	100	100	100	91	95	93	102	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	87	101	104	96	92	107	99	101	100	99	95	106	97	99
KWS Ambros(B)	H		VRS	105	107	101	105	98	89	102	99	101	110	110	101	100	102
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	103	98	99	103	96	103	98	98	87	97	93	92	97
KWS Vamos	H		VGL	110	110	116	113	116	98	109	105	112	103	112	105	116	109
PT 331	H	K*	EU1	90	95	85	91	109	92	103	93	83	87	94	95	82	93
Cezanne	H		EU1	105	103	113	102	132	89	108	105	105	89	113	79	100	102
RGT Keos	H		EU1	97	107	110	102	126	100	109	105	96	102	113	110	103	106
Hornela	H		EU1	116	92	112	99	115	95	101	106	112	105	113	95	113	105
Hemma	H		EU1	118	105	110	103	125	93	98	106	105	105	113	95	100	105
Haaland	H		EU1	111	110	109	106	124	96	99	104	112	91	102	107	102	105
Commodore	H	T*	EU1	95	110	91	103	120	101	105	101	94	83	96	97	100	101
LG Adamant	H	T*	EU1	101	98	118	108	131	99	104	113	113	91	103	100	101	105
LG Atkins	H	T*	EU1	96	102	111	109	121	97	99	101	110	98	101	97	100	103
Heden	H		EU1	105	110	98	107	123	105	107	103	114	90	98	95	101	105
Hindiana	H		EU1	111	109	108	99	129	90	103	102	109	109	112	106	108	106
Exantra	H	T*	EU1	93	93	111	95	123	84	99	100	107	85	106	103	95	98
RGT Eros	H		EU1	99	114	101	105	130	100	121	103	97	87	108	107	105	107
Mittel				102	103	104	102	118	97	104	103	103	95	104	99	100	102
Grenzdif.				10	10	9	8	9	10	8	6	7	8	8	9	9	-

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 205: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Marktleistung rel.

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				1780	1901	1064	2034	1597	2490	2399	1894	1610	1487	1198	1791	1830	1775
Ludger(B)	H	T	VRS	108	90	99	99	110	104	101	100	100	91	95	94	101	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	86	102	105	95	91	107	98	101	100	96	94	105	98	98
KWS Ambros(B)	H		VRS	106	108	96	106	98	90	101	99	100	113	111	101	101	102
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	106	102	99	105	97	102	97	99	90	97	91	90	98
KWS Vamos	H		VGL	112	109	116	114	116	99	107	106	115	102	114	104	116	109
PT 331	H	K*	EU1	89	95	88	89	108	91	100	91	84	83	94	94	82	92
Cezanne	H		EU1	105	100	111	102	131	88	105	102	104	89	112	76	98	101
RGT Keos	H		EU1	96	108	110	103	127	100	106	104	97	102	114	109	104	106
Hornela	H		EU1	112	89	111	97	112	92	97	102	109	99	111	93	109	101
Hemma	H		EU1	115	102	112	100	122	91	95	104	105	103	112	92	99	103
Haaland	H		EU1	109	110	109	104	121	95	95	102	110	91	100	103	99	103
Commodore	H	T*	EU1	95	112	90	105	122	103	106	102	97	84	96	97	99	101
LG Adamant	H	T*	EU1	99	98	122	107	130	99	101	112	113	90	101	96	100	104
LG Atkins	H	T*	EU1	95	100	108	110	120	96	95	101	111	94	100	95	99	101
Heden	H		EU1	102	106	92	106	120	102	102	100	112	86	96	90	97	101
Hindiana	H		EU1	110	107	108	97	127	89	100	100	107	108	111	103	105	104
Exantra	H	T*	EU1	93	92	113	95	123	83	96	98	108	82	107	100	94	97
RGT Eros	H		EU1	100	114	103	107	132	102	120	104	96	86	108	107	104	107
Mittel				101	103	104	102	117	96	102	102	103	93	103	97	99	101

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 206: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Ölertrag rel.

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				17,7	18,8	10,6	20,3	15,8	25,0	23,5	18,8	16,1	14,7	11,9	17,9	18,1	17,6
Ludger(B)	H	T	VRS	108	89	99	99	110	104	102	101	100	90	95	94	100	100
LG Activus(B)	H	T	VRS	85	102	105	95	91	107	97	101	100	96	94	105	98	98
KWS Ambros(B)	H		VRS	107	109	96	106	99	90	101	99	100	114	112	101	102	102
LG Baracuda	H	T+K	VGL	95	108	102	99	106	97	102	97	98	90	97	90	90	98
KWS Vamos	H		VGL	113	108	118	115	116	99	107	107	115	102	116	104	116	110
PT 331	H	K*	EU1	88	95	87	88	107	91	99	91	83	82	93	93	81	91
Cezanne	H		EU1	104	98	110	102	131	87	104	101	103	88	112	75	97	100
RGT Keos	H		EU1	96	109	111	104	127	100	105	103	97	101	114	109	104	106
Hornela	H		EU1	110	87	110	95	110	89	94	100	107	98	110	92	106	99
Hemma	H		EU1	113	100	110	99	121	90	92	103	104	101	111	90	98	101
Haaland	H		EU1	108	110	107	103	119	94	93	100	108	89	99	101	97	102
Commodore	H	T*	EU1	95	113	90	106	123	104	106	102	97	84	96	97	99	102
LG Adamant	H	T*	EU1	97	98	121	107	130	98	98	112	112	89	100	95	99	104
LG Atkins	H	T*	EU1	93	98	109	110	119	96	94	101	111	93	99	94	99	101
Heden	H		EU1	99	103	90	105	118	101	100	99	109	85	94	88	95	99
Hindiana	H		EU1	109	106	106	97	126	88	98	99	106	108	111	102	104	103
Exantra	H	T*	EU1	93	92	113	95	123	82	95	97	108	81	107	99	94	97
RGT Eros	H		EU1	100	113	103	107	133	102	121	105	96	84	108	107	103	107
Mittel				100	102	104	102	117	96	101	101	102	92	103	96	98	101

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 207: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026

% Öl bei 91 % TS

Sorte	Typ	E 1)	Prüf-status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				44,8	44,1	45,4	45,4	43,8	46,1	42,8	44,6	45,4	44,3	45,0	45,7	44,2	44,7
Ludger(B)	H	T	VRS	44,8	43,0	45,3	44,6	43,7	45,8	43,5	45,1	45,6	43,2	44,8	45,7	43,4	44,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	43,8	44,4	45,9	45,5	43,7	46,3	42,2	44,2	45,0	44,5	44,5	46,0	44,4	44,6
KWS Ambros(B)	H		VRS	45,7	44,9	45,0	46,1	44,1	46,1	42,8	44,5	45,6	45,2	45,8	45,3	44,9	45,1
LG Baracuda	H	T+K	VGL	44,5	46,0	46,1	46,0	44,8	46,3	42,6	44,6	45,3	44,2	45,1	44,4	43,2	44,8
KWS Vamos	H		VGL	45,4	43,5	46,5	46,1	44,1	46,6	42,2	45,3	45,9	44,1	46,5	46,3	44,2	45,1
PT 331	H	K*	EU1	43,5	43,9	44,7	44,1	43,5	45,5	41,5	44,1	43,9	43,1	44,7	44,7	43,7	43,9
Cezanne	H		EU1	43,9	41,9	43,9	45,8	43,4	44,6	41,7	43,1	44,1	42,5	44,6	43,8	43,1	43,6
RGT Keos	H		EU1	44,5	44,6	45,6	46,5	44,3	45,8	41,1	44,2	45,0	44,1	45,4	45,9	44,6	44,7
Hornela	H		EU1	42,2	41,7	43,6	43,5	42,0	43,2	39,6	42,2	43,6	42,2	44,0	44,0	41,6	42,6
Hemma	H		EU1	42,8	42,2	43,3	43,6	42,3	44,3	39,9	43,3	44,4	42,3	44,2	43,8	43,1	43,0
Haaland	H		EU1	43,0	43,9	43,5	44,3	42,2	44,8	40,3	43,1	43,4	42,3	43,9	43,6	42,1	43,1
Commodore	H	T*	EU1	44,6	45,5	45,4	46,9	44,9	47,2	43,0	45,4	45,2	44,0	45,0	45,5	43,9	45,1
LG Adamant	H	T*	EU1	43,0	44,0	44,6	45,6	43,7	45,4	40,4	44,3	44,6	42,9	43,9	44,0	43,1	43,8
LG Atkins	H	T*	EU1	43,2	42,6	46,1	46,2	43,4	45,5	40,7	44,3	44,9	43,3	44,4	44,6	43,6	44,1
Heden	H		EU1	42,1	41,4	42,5	44,4	42,0	44,0	40,0	42,5	42,4	43,2	43,4	42,6	41,6	42,5
Hindiana	H		EU1	43,5	43,2	43,9	44,8	42,9	44,7	40,7	43,3	44,1	43,6	44,7	44,4	42,6	43,6
Exantra	H	T*	EU1	44,2	43,6	45,7	45,3	43,8	44,8	41,1	43,7	44,6	43,1	45,6	44,7	43,8	44,1
RGT Eros	H		EU1	44,7	44,0	45,7	46,5	44,9	46,7	43,0	45,2	44,4	42,6	44,9	45,2	43,7	44,7
Mittel				43,9	43,7	44,9	45,4	43,5	45,5	41,5	44,0	44,5	43,3	44,8	44,7	43,4	44,1

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 208: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026

% Protein 91% TS

Sorte	Typ	E 1)	Prüf-status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Idstein	Dillstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				16,1	16,4	15,8	15,2	16,3	14,9	17,5	16,4	15,7	16,7	15,8	14,9	16,9	16,0
Ludger(B)	H	T	VRS	16,3	17,3	15,9	15,7	16,3	15,3	16,7	16,3	15,5	17,7	15,9	15,0	17,5	16,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	16,6	16,3	15,2	15,3	16,4	14,7	18,1	16,5	15,9	16,3	16,3	14,5	16,8	16,1
KWS Ambros(B)	H		VRS	15,5	15,4	16,2	14,8	16,1	14,8	17,6	16,6	15,6	16,0	15,2	15,4	16,3	15,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	16,9	14,8	15,0	15,3	15,6	15,2	17,9	16,7	15,9	16,9	16,3	15,9	18,6	16,2
KWS Vamos	H		VGL	16,1	17,9	15,2	15,1	16,4	14,9	18,3	16,6	15,5	17,3	15,1	15,0	17,4	16,2
PT 331	H	K*	EU1	18,0	17,6	16,7	17,0	16,8	16,3	19,1	18,2	17,3	18,6	16,8	16,4	18,5	17,5
Cezanne	H		EU1	15,9	17,8	16,3	13,8	15,9	15,6	17,7	17,5	16,0	17,2	15,6	15,8	17,6	16,3
RGT Keos	H		EU1	16,4	16,0	16,3	14,6	16,0	15,5	18,9	17,3	15,6	17,5	16,1	15,1	17,3	16,3
Hornela	H		EU1	16,8	17,8	15,7	15,4	16,1	15,6	19,0	17,0	15,9	17,4	15,3	15,1	18,0	16,5
Hemma	H		EU1	16,6	17,6	16,7	15,6	16,4	15,1	18,9	16,7	15,2	17,3	15,4	15,4	16,9	16,4
Haaland	H		EU1	16,6	16,1	16,7	14,8	16,2	14,5	18,4	16,9	16,5	17,3	15,6	15,6	17,7	16,4
Commodore	H	T*	EU1	16,2	15,8	15,6	13,5	15,7	14,1	17,9	16,4	16,0	17,2	16,1	15,5	17,4	15,9
LG Adamant	H	T*	EU1	17,0	15,7	15,5	14,4	15,4	14,7	18,9	16,1	15,7	17,2	16,6	15,6	17,3	16,2
LG Atkins	H	T*	EU1	17,1	17,6	15,1	14,7	16,3	15,2	18,9	17,1	16,1	17,9	16,3	15,9	17,2	16,6
Heden	H		EU1	18,0	17,8	17,6	15,2	16,8	15,3	19,3	17,6	17,8	18,0	17,0	17,1	18,8	17,4
Hindiana	H		EU1	16,5	16,8	16,5	15,3	16,3	15,2	18,1	17,4	16,0	17,1	15,5	15,3	17,7	16,4
Exantra	H	T*	EU1	16,2	16,8	15,3	14,5	15,9	15,7	18,6	17,0	16,2	17,1	14,6	15,6	17,5	16,2
RGT Eros	H		EU1	16,3	16,4	15,3	14,1	15,4	14,3	17,9	16,3	16,3	18,1	15,7	15,6	17,8	16,1
Mittel				16,6	16,7	15,9	14,9	16,1	15,1	18,3	16,9	16,1	17,4	15,8	15,5	17,6	16,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 209: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Glucosinolatgehalt (µmol/g; 91% TS, 40% Öl)

Sorte	Typ	E 1)	Prüf-status	Hohenschulen	Otterham	Wehen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				16,4	17,3	13,6	14,8	14,7	14,6	15,2	11,7	14,0	17,0	14,9	14,2	16,2	15,0
Ludger(B)	H	T	VRS	18,8	22,0	15,5	19,8	17,0	15,2	15,1	13,6	14,6	16,3	15,1	15,5	17,4	16,6
LG Activus(B)	H	T	VRS	15,1	16,6	12,6	13,2	13,7	16,1	16,1	10,0	14,2	18,2	15,1	11,3	15,9	14,5
KWS Ambros(B)	H		VRS	15,2	13,4	12,8	11,2	13,3	12,5	14,3	11,5	13,2	16,4	14,6	15,9	15,4	13,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	16,4	14,7	11,1	15,1	12,8	14,2	15,2	12,2	11,8	14,9	14,8	17,2	18,0	14,5
KWS Vamos	H		VGL	15,4	19,0	11,1	12,5	12,5	17,1	15,1	12,4	14,6	18,8	14,6	16,5	14,7	14,9
PT 331	H	K*	EU1	14,1	12,9	9,4	10,5	11,5	14,6	13,7	14,0	10,5	18,5	13,1	10,2	12,5	12,7
Cezanne	H		EU1	16,3	15,3	14,5	12,3	17,1	16,5	17,9	16,1	14,2	17,3	19,7	16,0	15,8	16,1
RGT Keos	H		EU1	12,5	13,1	12,0	7,1	14,7	13,3	11,2	13,9	11,7	15,5	11,2	13,9	15,3	12,7
Hornela	H		EU1	13,5	17,2	12,4	14,2	15,2	15,2	16,8	14,4	13,8	18,0	13,2	14,3	15,5	14,9
Hemma	H		EU1	16,3	21,0	15,3	13,3	13,3	15,3	16,6	12,8	12,8	17,4	12,9	15,8	14,8	15,2
Haaland	H		EU1	18,2	17,6	17,9	14,5	17,7	16,9	15,9	18,8	18,3	22,7	17,8	18,6	16,3	17,8
Commodore	H	T*	EU1	20,2	14,6	12,2	12,0	15,8	16,2	14,6	12,4	12,3	18,6	17,9	17,6	16,1	15,4
LG Adamant	H	T*	EU1	17,6	15,4	11,3	13,5	13,8	15,6	15,9	14,7	14,4	18,8	19,2	18,2	18,7	15,9
LG Atkins	H	T*	EU1	12,9	12,4	13,1	13,4	13,3	12,9	13,5	12,9	13,4	15,2	15,5	13,8	13,4	13,5
Heden	H		EU1	14,6	14,0	11,0	11,6	14,8	14,0	17,0	16,6	14,3	17,9	15,2	16,4	15,9	14,9
Hindiana	H		EU1	19,3	16,6	18,9	17,2	18,0	17,9	17,4	17,9	17,6	20,8	19,2	19,7	21,8	18,6
Exantra	H	T*	EU1	17,5	18,5	14,9	16,1	17,6	18,0	19,7	15,6	19,0	17,5	16,3	20,3	21,3	17,9
RGT Eros	H		EU1	15,9	11,9	13,9	11,8	10,8	13,9	11,7	12,9	14,5	19,9	13,3	16,1	16,0	14,0
Mittel				16,1	15,9	13,4	13,1	14,7	15,4	15,4	14,1	14,2	18,0	15,6	15,8	16,4	15,2

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 210: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Tausendkornmasse bei 91%TS g

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				5,4	4,5	4,9	4,3	4,2	4,7	4,0	4,2	4,5	5,9	4,8	4,7	4,7	4,7
Ludger(B)	H	T	VRS	5,2	4,2	4,6	4,2	4,1	4,6	3,9	4,3	4,2	6,0	4,8	4,4	4,3	4,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	5,9	4,9	5,2	4,9	4,9	5,1	4,1	4,7	5,1	6,4	5,2	5,1	5,3	5,1
KWS Ambros(B)	H		VRS	5,1	4,5	4,8	3,9	3,8	4,3	4,0	3,7	4,3	5,4	4,5	4,6	4,4	4,4
LG Baracuda	H	T+K	VGL	5,6	4,8	5,2	4,3	4,2	4,7	4,4	4,2	4,9	5,9	5,2	5,2	4,6	4,9
KWS Vamos	H		VGL	5,3	4,2	4,6	4,1	4,3	4,5	4,0	4,2	4,5	6,1	4,9	4,8	4,6	4,6
PT 331	H	K*	EU1	5,1	4,0	4,3	3,9	3,9	4,2	3,6	4,1	4,0	5,5	4,4	4,2	4,0	4,3
Cezanne	H		EU1	5,3	4,1	4,9	3,8	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	5,8	4,5	4,6	4,4	4,5
RGT Keos	H		EU1	5,1	4,0	4,5	3,7	3,8	4,2	4,0	4,0	4,0	5,4	4,6	4,4	4,0	4,3
Hornela	H		EU1	5,6	4,1	4,8	4,1	4,1	4,5	4,2	4,3	4,4	6,0	4,8	4,9	4,6	4,6
Hemma	H		EU1	5,7	4,6	5,3	4,5	4,5	4,9	4,4	4,6	4,8	6,5	5,0	5,1	4,6	4,9
Haaland	H		EU1	6,0	4,4	5,1	4,3	4,2	4,5	4,2	4,8	4,5	6,7	5,0	5,2	4,5	4,9
Commodore	H	T*	EU1	4,9	3,9	4,0	3,3	3,7	4,0	4,0	3,8	3,8	5,5	4,4	4,4	3,9	4,1
LG Adamant	H	T*	EU1	5,4	4,0	4,7	4,1	4,0	4,4	4,1	4,0	4,1	6,0	4,8	5,0	4,6	4,6
LG Atkins	H	T*	EU1	5,6	4,3	5,0	4,2	4,1	4,5	4,2	4,4	4,4	6,0	5,0	5,1	4,7	4,7
Heden	H		EU1	5,7	4,8	5,5	4,3	4,4	4,3	4,2	4,5	4,6	6,2	4,9	5,2	4,8	4,9
Hindiana	H		EU1	5,4	4,5	5,1	4,4	4,7	4,5	4,0	4,1	4,5	5,7	4,7	4,8	4,3	4,7
Exantra	H	T*	EU1	5,0	4,3	4,5	3,7	3,9	4,4	4,1	3,8	4,3	6,0	4,4	4,5	4,2	4,4
RGT Eros	H		EU1	5,2	4,2	4,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,2	4,1	5,8	4,5	4,6	4,3	4,4
Mittel				5,4	4,3	4,8	4,1	4,1	4,4	4,1	4,2	4,4	5,9	4,7	4,8	4,4	4,6

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 211: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Mängel vor Winter

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				2,9	3,3	4,7	1,0	1,0	1,7	1,7	1,0	1,7	2,3	3,2	3,0	1,3	2,2
Ludger(B)	H	T	VRS	2,3	2,8	4,7	1,0	1,0	2,3	2,0	1,0	2,0	2,3	3,3	3,3	1,3	2,3
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,3	4,3	5,3	1,0	1,0	1,5	1,7	1,0	2,0	2,7	3,3	3,3	1,3	2,4
KWS Ambros(B)	H		VRS	3,0	2,8	4,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0	2,0	3,0	2,3	1,3	1,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,0	3,3	4,7	1,0	1,0	2,0	2,7	1,0	1,8	2,7	3,7	3,0	1,7	2,4
KWS Vamos	H		VGL	3,5	4,8	5,7	1,0	1,0	1,7	2,0	1,0	2,0	2,3	2,7	2,7	1,0	2,4
PT 331	H	K*	EU1	2,8	3,3	4,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,3	2,3	3,0	3,3	1,3	2,2
Cezanne	H		EU1	3,0	3,3	4,7	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	1,8	2,0	3,3	3,3	1,3	2,2
RGT Keos	H		EU1	2,8	4,0	4,7	1,0	1,0	1,7	2,7	1,0	2,3	2,0	3,3	3,0	1,3	2,4
Hornela	H		EU1	3,5	3,8	5,3	1,0	1,0	1,7	1,7	1,0	1,8	2,3	3,3	4,0	1,0	2,4
Hemma	H		EU1	2,8	3,5	4,7	1,0	1,0	1,0	1,7	1,0	2,0	2,3	2,7	2,7	1,0	2,1
Haaland	H		EU1	2,8	3,3	5,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,3	2,3	2,7	3,7	1,3	2,3
Commodore	H	T*	EU1	2,8	2,8	4,3	1,0	1,0	1,3	1,7	1,0	2,5	2,0	3,0	3,3	1,0	2,1
LG Adamant	H	T*	EU1	2,3	3,5	5,0	1,0	1,0	1,0	1,7	1,0	2,3	2,0	2,7	3,3	1,3	2,2
LG Atkins	H	T*	EU1	2,8	4,0	4,7	1,0	1,0	1,7	2,0	1,0	1,8	2,0	2,7	2,3	1,0	2,1
Heden	H		EU1	3,3	3,3	5,3	1,0	1,0	1,3	2,7	1,0	2,3	2,7	3,3	2,7	1,3	2,4
Hindiana	H		EU1	2,5	3,0	4,7	1,0	1,0	1,3	2,0	1,0	1,8	2,3	3,0	2,7	1,3	2,1
Exantra	H	T*	EU1	2,5	3,5	4,7	1,0	1,0	1,5	1,3	1,0	2,0	2,3	2,7	2,7	1,3	2,1
RGT Eros	H		EU1	2,8	3,3	5,0	1,3	1,0	1,7	2,7	1,0	2,0	2,7	3,7	3,3	1,3	2,4
Mittel				2,9	3,5	4,8	1,0	1,0	1,5	1,9	1,0	2,0	2,3	3,1	3,1	1,3	2,3

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 212: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Mängel nach Winter

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Düllstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				3,0	3,2	4,4	2,2	1,0	1,4	1,9	1,0	1,7	3,1	3,1	4,0	1,0	2,4
Ludger(B)	H	T	VRS	3,0	2,8	5,7	2,3	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	3,7	3,0	5,0	1,0	2,6
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,0	4,0	5,0	2,5	1,0	1,5	1,7	1,0	2,0	3,0	3,3	4,0	1,0	2,5
KWS Ambros(B)	H		VRS	3,0	2,8	2,7	1,8	1,0	1,0	2,3	1,0	1,0	2,7	3,0	3,0	1,0	2,0
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,8	3,3	3,7	1,7	1,0	2,0	2,3	1,0	1,8	4,3	3,0	3,7	1,0	2,4
KWS Vamos	H		VGL	3,0	4,8	5,7	2,0	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	4,0	3,0	3,7	1,0	2,6
PT 331	H	K*	EU1	3,0	3,0	3,7	1,5	1,0	1,3	2,0	1,0	2,3	4,3	3,0	4,7	1,0	2,4
Cezanne	H		EU1	3,0	2,8	5,0	1,3	1,0	1,7	2,3	1,0	1,8	3,0	3,0	4,0	1,0	2,4
RGT Keos	H		EU1	3,0	3,5	5,0	2,0	1,0	1,7	2,3	1,0	2,3	3,3	3,0	3,7	1,0	2,5
Hornela	H		EU1	3,0	3,8	4,3	1,3	1,0	2,0	2,7	1,0	1,8	3,3	3,0	5,7	1,0	2,6
Hemma	H		EU1	3,0	3,5	4,7	1,8	1,0	1,7	1,7	1,0	2,0	3,3	3,0	4,7	1,0	2,5
Haaland	H		EU1	3,0	3,0	5,3	1,8	1,0	1,3	2,3	1,0	2,3	3,0	3,0	4,7	1,0	2,5
Commodore	H	T*	EU1	2,8	2,8	3,7	2,3	1,0	1,3	2,3	1,0	2,5	3,3	3,0	4,3	1,0	2,4
LG Adamant	H	T*	EU1	3,0	3,3	5,3	2,3	1,0	1,0	2,7	1,0	2,3	3,0	3,0	4,3	1,0	2,5
LG Atkins	H	T*	EU1	2,8	4,0	3,7	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,8	4,0	3,3	3,7	1,0	2,5
Heden	H		EU1	3,3	3,3	5,7	1,8	1,0	1,3	2,3	1,0	2,3	4,0	3,0	4,3	1,0	2,6
Hindiana	H		EU1	3,0	2,8	3,7	2,3	1,0	1,7	2,3	1,0	1,8	2,0	2,7	3,7	1,0	2,2
Exantra	H	T*	EU1	2,8	3,5	3,7	2,0	1,0	1,0	2,7	1,0	2,0	4,7	3,0	4,0	1,0	2,5
RGT Eros	H		EU1	2,8	3,3	4,0	2,0	1,0	1,7	2,0	1,0	2,0	4,0	3,0	3,7	1,0	2,4
Mittel				2,9	3,3	4,4	1,9	1,0	1,6	2,2	1,0	2,0	3,5	3,0	4,2	1,0	2,5

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 213: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Pflanzenlänge cm

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Hohenschulen	Otterham	Wehnen	Thüle	Giessen	Idstein	Dülldstadt	Moosburg	Malchow	Klein Bünzow	Sonnenwalde	Gebstedt	Leutewitz	Mittel 13 Orte
Mittel (B)				145	176	129	164	147	169	164	152	139	108	127	117	139	144
Ludger(B)	H	T	VRS	146	171	126	162	146	165	162	149	136	103	125	115	140	142
LG Activus(B)	H	T	VRS	134	174	128	158	144	160	154	145	131	103	122	113	132	138
KWS Ambros(B)	H		VRS	154	183	133	173	152	182	177	161	149	118	133	122	144	152
LG Baracuda	H	T+K	VGL	143	184	136	168	163	165	172	158	138	108	128	127	140	148
KWS Vamos	H		VGL	149	183	125	173	157	170	172	159	143	107	132	118	148	149
PT 331	H	K*	EU1	157	204	139	184	167	192	177	164	159	122	150	127	153	161
Cezanne	H		EU1	152	196	142	182	156	195	181	164	149	112	142	123	151	157
RGT Keos	H		EU1	150	186	126	173	154	177	171	158	146	118	135	128	150	152
Hornela	H		EU1	155	194	142	182	168	187	176	159	156	123	143	132	152	159
Hemma	H		EU1	155	194	135	180	161	186	173	160	152	123	137	123	155	156
Haaland	H		EU1	152	199	133	179	160	177	172	156	147	117	132	130	148	154
Commodore	H	T*	EU1	149	185	132	170	153	165	171	154	139	110	128	122	144	148
LG Adamant	H	T*	EU1	145	189	142	181	159	174	173	158	148	117	128	127	151	153
LG Atkins	H	T*	EU1	138	175	140	168	150	168	163	146	136	113	127	120	141	145
Heden	H		EU1	154	194	139	184	157	183	171	158	149	112	132	123	147	154
Hindiana	H		EU1	159	198	147	181	160	183	173	161	153	118	140	122	155	158
Exantra	H	T*	EU1	153	198	143	186	160	195	180	165	155	118	142	133	157	160
RGT Eros	H		EU1	154	196	139	179	163	179	181	166	145	115	138	132	149	157
Mittel				150	188	136	175	157	177	172	158	146	114	134	124	147	152

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambros)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 214: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Lager bei Reife

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Thüle	Malchow	Mittel 3 Orte
Mittel (B)				3,8	3,0	1,3	2,7
Ludger(B)	H	T	VRS	3,8	2,7	1,0	2,5
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,0	1,8	1,0	1,9
KWS Ambos(B)	H		VRS	4,8	4,5	2,0	3,8
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,3	3,3	1,0	2,5
KWS Vamos	H		VGL	3,5	4,3	1,0	2,9
PT 331	H	K*	EU1	3,0	1,5	1,0	1,8
Cezanne	H		EU1	4,5	3,7	1,0	3,1
RGT Keos	H		EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
Hornela	H		EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
Hemma	H		EU1	3,8	2,8	1,0	2,5
Haaland	H		EU1	3,3	2,0	1,0	2,1
Commodore	H	T*	EU1	3,5	2,3	1,0	2,3
LG Adamant	H	T*	EU1	3,0	2,3	1,0	2,1
LG Atkins	H	T*	EU1	3,3	1,8	1,0	2,0
Heden	H		EU1	3,0	3,0	1,0	2,3
Hindiana	H		EU1	3,3	2,0	1,0	2,1
Exantra	H	T*	EU1	4,3	2,5	1,0	2,6
RGT Eros	H		EU1	3,8	3,0	1,0	2,6
Mittel				3,5	2,6	1,1	2,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 215: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Lager vor Ernte

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Wehnen	Thüle	Mittel 3 Orte
Mittel (B)				3,1	2,0	3,3	2,8
Ludger(B)	H	T	VRS	3,3	2,0	3,0	2,8
LG Activus(B)	H	T	VRS	2,5	2,0	1,8	2,1
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,5	2,0	5,0	3,5
LG Baracuda	H	T+K	VGL	2,8	2,0	3,3	2,7
KWS Vamos	H		VGL	2,5	2,0	4,5	3,0
PT 331	H	K*	EU1	2,0	2,0	1,5	1,8
Cezanne	H		EU1	3,5	2,0	3,7	3,1
RGT Keos	H		EU1	2,3	2,0	2,3	2,2
Hornela	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Hemma	H		EU1	2,3	2,0	2,8	2,3
Haaland	H		EU1	2,5	2,0	2,0	2,2
Commodore	H	T*	EU1	2,3	2,0	2,3	2,2
LG Adamant	H	T*	EU1	2,5	2,0	2,3	2,3
LG Atkins	H	T*	EU1	2,0	2,0	1,8	1,9
Heden	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Hindiana	H		EU1	2,3	2,0	2,0	2,1
Exantra	H	T*	EU1	2,8	2,0	3,5	2,8
RGT Eros	H		EU1	2,0	2,0	3,0	2,3
Mittel				2,5	2,0	2,7	2,4

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP

Auswertung 216: EUSV 1 Winterraps 2026, mehrortige Auswertung, Stand: 09.09.2026
Reifeverzögerung des Strohs

Sorte	Typ	E 1)	Prüf- status	Otterham	Düllstadt	Malchow	Leutewitz	Mittel 4 Orte
Mittel (B)				3,0	2,9	5,8	4,9	4,2
Ludger(B)	H	T	VRS	2,0	2,7	6,0	5,3	4,0
LG Activus(B)	H	T	VRS	3,8	2,3	6,8	5,3	4,5
KWS Ambos(B)	H		VRS	3,3	3,7	4,8	4,0	3,9
LG Baracuda	H	T+K	VGL	3,0	3,0	6,0	5,0	4,3
KWS Vamos	H		VGL	4,3	4,0	5,8	5,3	4,8
PT 331	H	K*	EU1	4,8	1,7	8,0	6,3	5,2
Cezanne	H		EU1	3,5	3,7	6,0	6,0	4,8
RGT Keos	H		EU1	4,0	3,7	5,8	6,0	4,9
Hornela	H		EU1	3,5	3,0	6,3	4,3	4,3
Hemma	H		EU1	3,5	3,3	6,0	4,3	4,3
Haaland	H		EU1	3,8	3,3	6,8	5,0	4,7
Commodore	H	T*	EU1	5,3	3,0	7,5	5,7	5,4
LG Adamant	H	T*	EU1	3,3	2,0	6,8	5,0	4,3
LG Atkins	H	T*	EU1	4,3	4,0	7,0	7,0	5,6
Heden	H		EU1	4,3	2,7	6,8	4,7	4,6
Hindiana	H		EU1	3,8	3,3	6,0	3,3	4,1
Exantra	H	T*	EU1	2,8	4,0	4,5	3,3	3,6
RGT Eros	H		EU1	5,5	3,7	6,8	6,7	5,6
Mittel				3,8	3,2	6,4	5,3	4,7

Typ: H = Hybridsorte

1) E = besondere Eigenschaft:

K = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz

K* = Sorte mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz nach Angabe des Züchters

T = TuYV-Resistenz

T* = TuYV-Resistenz nach Angabe des Züchters

Stufengerechte Bezugsbasis

Ort=@: Sorte (Ludger, LG Activus, KWS Ambos)

Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP