



### Sortenversuch frühreifer Winterweizen Relativerträge 2017

Mittel aus Stufe 2 & 3

Sorte	Qualität	Marsch		Mittel Marsch**		
		Sönke-Nissen-Koog uL/90	Barlt sL/75	2017	2016	2015
Versuchsstandort Bodenart/Ackerzahl rel. 100 = dt/ha		110,1	107,0	<b>109,1</b>	<b>87,8</b>	<b>(115,1)</b>
Kerubino*	(EU,E)	98	99	99	98	96
Boregar*	(A, EU)	102	101	101	108	101
Faustus	B	-	106	[107]	106	-
Rumor	B	102	102	104	106	104
RGT Scramento	B	106	101	102		
GD 5% (rel.)		3	5	5	11	4

\* = Bezugsorten

[ ] = nicht auf allen Standorten geprüft

\*\* Ergebnisse von Versuchsstandorten Otterndorf und Schoonorth aus Niedersachsen berücksichtigt und verrechnet



## Sortenversuch frühreifer Winterweizen Relativerträge 2017

Mittel aus Stufe 2 & 3

Sorte	Qualität	Östliches Hügelland			Mittel Östl. Hügelland S-H		
		Loit sL/55-60	Futterkamp <sup>(Stf. 3)</sup> sL/60	Harzhof <sup>(Stf. 3)</sup> sL/57	2017	2016	(2015)
Versuchsstandort Bodenart/Ackerzahl rel. 100 = dt/ha		114,9	112,7	105,2	<b>110,9</b>	<b>105,2</b>	<b>(130,9)</b>
Kerubino*	(EU,E)	98	99	100	99	98	96
Boregar*	(A, EU)	102	101	100	101	105	100
Faustus	B	100	106	108	105	103	-
Rumor	B	96	-	99	[97]	103	97
RGT Scramento	B	-	103	101	[102]		
GD 5% (rel.)		6	9	5	7	5	6

\* = Bezugsorten

(Stf. 3) = Nur Stufe 3 ortsüblich/intensiv

[ ] = nicht auf allen Standorten geprüft