

Rohproteingehalte in den LSV Ackerbohnen 2019

im Anbaubereich Küstenregion

% RP bei 86 % TS

Orte	E	Barlt ¹⁾	Kastorf ¹⁾	Loit ¹⁾	Futter- kamp ¹⁾	Hohen- lieth ²⁾	Linden- hof ³⁾ (Mulch)	Linden- hof ³⁾ (Pflug)	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
									2019	2018	2017	2016	2015
									4	7	6	5	6
Fuego		22,5	23,3	26,9	23,5	25,2	24,8	23,9	24,3	26,0	28,9	27,4	23,6
Fanfare		26,4	24,9	25,3	24,1	24,6	26,2	24,9	25,2	26,1	28,3	27,5	24,5
Taufun	t	26,0	24,6	27,2	23,4	24,5	25,9	24,4	25,1	25,6	28,3	27,2	24,4
Tiffany	v	26,2	22,1	25,6	27,0	25,2	27,7	26,5	25,8	24,1	29,9	27,5	26,0
Birgit		27,4	23,1	25,6	23,8	25,2	26,9	25,4	25,3	26,1	28,0	-	-
Trumpet		24,1	25,2	25,4	20,7	27,4	23,6	23,7	24,3	23,3	-	-	-
Macho		21,0	22,0	24,1	21,6	22,3	24,7	22,2	22,6	-	-	-	-
Bianca	tv	25,7	24,3	28,1	24,9	26,3	27,5	25,4	26,0	-	-	-	-
Mittel		24,9	23,7	26,0	23,6	25,1	25,9	24,6	24,8	25,2	28,7	27,4	24,6

E = Besondere Eigenschaft: t = tanninfreie Sorte, v = vicin- und convicinfreie Sorte

Gemeinsame Prüfung von:

1) LK Schleswig-Holstein, 2) Norddeutsche Pflanzenzucht

3) FH Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft Osterröndfeld