

Tabelle: Ökoackerbohnen in Lundsgaard 2019
Ertrag, Proteingehalt und Bonituren

| Sorte | Merkmal | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|
| | Kornertrag dt/ha (rel.) ^[*1] | Protein- gehalt in % | Mängel im Aufgang Note 1-9 | Bodendeck- ungsgrad in % | Massenbildung im Anfang Note 1-9 | Maßenbildung in der Jugend- entwicklung Note 1-9 | Pflanzen- länge in cm |
| Bianca ⁽²⁾ | 90 | 28,5 | 1,5 | 18,8 | 2,8 | 3,8 | 118 |
| Birgit | 111 | 29,3 | 2,0 | 23,8 | 2,8 | 4,0 | 124 |
| Daisy | 92 | 26,9 | 3,0 | 20,0 | 2,5 | 3,0 | 113 |
| Fanfare | 106 | 27,1 | 2,8 | 20,0 | 2,5 | 3,0 | 116 |
| Fuego | 108 | 27,4 | 2,8 | 21,3 | 2,8 | 3,3 | 110 |
| GL Sunrise ⁽³⁾ | 103 | 31,0 | 2,3 | 21,3 | 2,8 | 3,5 | 110 |
| Stella | 93 | 27,6 | 2,8 | 22,5 | 2,5 | 3,3 | 116 |
| Tiffany ⁽⁴⁾ | 98 | 27,3 | 2,5 | 17,5 | 2,3 | 2,8 | 116 |
| Trumpet | 106 | 26,4 | 2,5 | 21,3 | 2,5 | 3,0 | 113 |
| Standardmittel | 48,7 | 28,0 | | | | | |
| Versuchsmittel | 101 | 27,9 | 2,4 | 20,7 | 2,6 | 3,3 | 115 |
| GD 5% | 7 | | | | | | |

Sorten des Standardmittels: ‚Bianca‘; ‚Birgit‘; ‚Daisy‘; ‚Stella‘; ‚Trumpet‘; ‚GL Sunrise‘; ‚Fanfare‘; ‚Tiffany‘

[*1]= Bezogen auf das Standardmittel

(2)= tannin- u. vincinarm; (3)= tanninarm; (4)= vincin/civincinarm

