



Tabelle: Ökoackerbohnen Futterkamp 2022
- Kornerträge und Qualitäten -

Sorte	Merkmal		
	Kornertrag (rel.) ^(*)	Protein- gehalt in %	Tausend- korngewicht in g
rel. 100	47,1 dt/ha		
Allison ^(*)	89	25,4	554,3
Birgit	91	26,4	562,6
Bolivia	87	25,8	492,8
Caprice	109	26,2	594,8
Daisy	108	25,7	569,4
Fanfare	102	25,8	586,8
GL Jasmin	67	26,2	553,3
GL Lucia	94	25,8	597,2
GL Magnolia	98	28,7	612,6
Stella	104	24,9	590,9
Tiffany ^(*)	108	26,6	586,6
Trumpet	108	24,2	535,0
Versuchsmittel	97	26,0	569,7
GD 5%	10		

(*) = Erträge relativ zum Mittel der Bezugssorten

Bezugssorten:

Allison, Caprice, Fanfare, GL Lucia, Stella, Tiffany, Trumpet, Bolivia

(*) = vicinarm; (*) = vicin- u. convicinarm

Tabelle: Ökoackerbohnen Futterkamp 22
- Bonituren des Entwicklungsverlaufes und der Krankheiten -

Sorte	Merkmal					
	Bodendeckungsgrad in %	Massenbildung im Anfang Note 1-9	Massenbildung in der Jugendentwicklung Note 1-9	Pflanzenlänge in cm	Mehltau Note 1-9	Rost Note 1-9
Allison	58,0	4,8	6,8	132	6,4	6,6
Birgit	63,0	5,2	7,8	144	4,0	6,4
Bolivia	60,0	4,2	6,6	137	4,4	5,6
Caprice	65,0	5,0	7,4	138	4,4	6,6
Daisy	59,0	4,6	7,4	137	5,0	7,8
Fanfare	58,0	4,4	6,6	140	4,2	6,6
GL Jasmin	52,0	3,6	5,2	120	2,0	2,8
GL Lucia	61,0	5,0	7,0	149	6,4	3,6
GL Magnolia	60,0	5,0	7,2	152	3,4	7,2
Stella	62,0	4,6	7,8	138	4,4	6,2
Tiffany	61,0	4,4	6,8	140	4,6	7,0
Trumpet	59,0	4,6	6,6	139	2,6	8,2
Versuchsmittel	59,8	4,6	6,9	139	4,3	6,2