



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Versuchsergebnisse Ökokartoffeln Schleswig-Holstein 2018 -Datenblätter der geprüften Kartoffelsorten-





Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Versuchsergebnisse Ökokartoffeln Schleswig-Holstein 2018 -Hinweise zu den Datenblättern der geprüften Kartoffelsorten-

* = Knollenform, Fleischfarbe, Schalenfarbe, Kochtyp = Angaben aus der Beschreibenden Sortenlisten Kartoffeln 2018 des Bundessortenamtes

() = Werte in Klammern entsprechen Ø des Erntejahres 2018

Krautfäulebonituren 2018

Aufgrund der Witterung (langanhaltende Hitze und Trockenheit) ist die Krautfäule nicht aufgetreten. Krautfäule-Boniturdaten sind deshalb 2018 nicht angefallen.

Sorte: ‚Allians‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	EU(2011)
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	6



Sorte: ‚Allians‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	299 dt/ha 386 dt/ha
Zeiternte: Ø Knollenansatz/Staude	11,4
Sortierergebnisse 17.07.2018 in %	
< 35 mm (1,2)	1,7
35-50 mm (56,3)	86,2
50-65 mm (40,5)	11,6
> 65 mm (2,1)	0,6
Endernte: Sortierergebnisse 12.09.2018 in %	
< 35 mm (8,3)	9,4
35-50 mm (31,7)	53,3
50-65 mm (46,9)	31,8
> 65 mm (13,1)	5,6
Stärkegehalt in % (13,3)	15,2
Anzahl (von 100 Knollen):	
Wachstumsrisse Knollen: (1)	0
Zweitwuchs Knollen: (4)	4
Nassfäule Knollen: (0)	0
Braunfäule Knollen: (0)	1
Trockenfäule Knollen: (2)	1
Anzahl grüne Knollen: (3)	1
Anzahl (von 100 Knollen) Schorf:	
Besatz in %: (0,8)	2,0
Anzahl (von 100 Knollen) Rhizoctonia:	
Besatz in %: (1,0)	0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	3,60 Platz: 5

Sorte: ‚Almonda‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Saka
Zulassungsjahr:	2013
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	4



Sorte: ‚Almonda‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	303 dt/ha 465 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	7,7 0,3 35,7 62,1 1,9
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,5 19,1 56,7 16,8
Stärkegehalt in % (13,3)	13,8
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	5,20 Platz: 15

Sorte: ‚Aromata‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend


Züchter:	NSP
Zulassungsjahr:	EU
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	2



Sorte: ‚Aromata‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	283 dt/ha 349 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	6,7 0,5 27,6 63,4 8,6
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	9,4 25,2 46,8 18,6
Stärkegehalt in % (13,3)	13,5
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	2 0 0 0 2 12
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,07 Platz: 9

Sorte: ‚Ballerina‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
oval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	NSP
Zulassungsjahr:	EU
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	2



Sorte: ‚Ballerina‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	298 dt/ha 395 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortierergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	9,1 0,9 52,4 46,7 0,0
Endernte: Sortierergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	9,2 32,8 46,3 11,7
Stärkegehalt in % (13,3)	14,0
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 2 4
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	3,0 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	3,53 Platz: 4

Sorte: ‚Campina‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
oval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Solana
Zulassungsjahr:	2009
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	6



Sorte: ‚Campina‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	301 dt/ha 397 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	10,4 0,9 68,8 29,1 1,2
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,7 45,6 38,6 7,0
Stärkegehalt in % (13,3)	13,2
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 2 2
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	5,33 Platz: 16

Sorte: ‚Goldmarie‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Norika
Zulassungsjahr:	2013
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	5



Sorte: ‚Goldmarie‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	281 dt/ha 357 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	9,9 1,4 79,9 18,3 0,5
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	10,0 51,0 33,4 5,6
Stärkegehalt in % (13,3)	13,2
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 0 2
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	2,60 Platz: 2

Sorte: ‚Julinka‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
rundoval	gelb	gelb	vorwiegend festkochend

Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	2012
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	1



Sorte: ‚Julinka‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	348 dt/ha 443 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	7,4 0,3 27,4 60,7 11,7
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,1 22,1 50,8 19,0
Stärkegehalt in % (13,3)	14,0
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 6 0 0 4 3
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,2 0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	5,33 Platz: 16

Sorte: ‚Linda‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Ellenberg
Zulassungsjahr:	2010
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	3



Sorte: ‚Linda‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	256 dt/ha 442 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,2 0,8 59,2 39,4 0,6
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,4 32,6 45,4 13,8
Stärkegehalt in % (13,3)	14,2
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 5 0 0 0 1
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	3,3 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,07 Platz: 9

Sorte: ‚Linda (Kühllager)‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Ellenberg
Zulassungsjahr:	2010
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	3



Sorte: ‚Linda (Kühllager)‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	276 dt/ha 471 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	10,1 1,4 68,6 28,1 2,0
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,3 37,9 42,2 11,7
Stärkegehalt in % (13,3)	13,8
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	4 5 0 0 7 2
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	3,67 Platz: 6

Sorte: ‚LunaRossa‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
oval	tiefgelb	rot	vorwiegend festkochend

Züchter:	NSP
Zulassungsjahr:	EU
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	2



Sorte: ‚LunaRossa‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	246 dt/ha 423 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortierergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,1 0,9 56,6 42,5 0,0
Endernte: Sortierergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,8 23,3 55,2 13,7
Stärkegehalt in % (13,3)	14,8
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	4 2 0 0 2 9
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,47 Platz: 12

Sorte: ‚Mariola‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
rundoval	tiefgelb	gelb	vorwiegend festkochend


Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	2010
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	6



Sorte: ‚Mariola‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	306 dt/ha 481 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	9,9 0,9 49,3 49,3 0,6
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,2 26,0 54,0 12,8
Stärkegehalt in % (13,3)	13,8
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,8 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	3,80 Platz: 7

Sorte: ‚Montana‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
oval	tiefgelb	gelb	festkochend

Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	2013
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	4



Sorte: ‚Montana‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	293 dt/ha 428 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,5 0,7 45,3 52,2 1,8
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,3 28,9 50,1 12,7
Stärkegehalt in % (13,3)	11,2
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	4 4 0 0 8 4
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	2,93 Platz: 3

Sorte: ‚Otolia‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
rundoval	gelb	gelb	Vorwiegend festkochend


Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	2014
Reifegruppe:	Mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	1



Sorte: ‚Otolia‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	256 dt/ha 400 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	6,4 0,4 35,7 58,5 5,4
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,5 14,5 48,8 29,2
Stärkegehalt in % (13,3)	13,0
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 4 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	3,1 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,47 Platz: 12

Sorte: ‚Queen Anne‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	vorwiegend festkochend

Züchter:	Saka
Zulassungsjahr:	2012
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	6



Sorte: ‚Queen Anne‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	270 dt/ha 499 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,3 0,8 65,3 33,9 0,0
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,1 32,7 49,7 10,5
Stärkegehalt in % (13,3)	13,5
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,6 0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	5,53 Platz: 19

Sorte: ‚Red Emmalie‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
lang	rot	rot	Vorwiegend festkochend

Züchter:	Ellenberg
Zulassungsjahr:	2013
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	1



Sorte: ‚Red Emmalie‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	256 dt/ha 479dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	9,4 4,1 82,6 13,4 0,0
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	10,2 58,7 29,2 1,9
Stärkegehalt in % (13,3)	10,2
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 44 4 6 2 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	5,53 Platz: 19

Sorte: ‚Sunshine‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	vorwiegend festkochend

Züchter:	Solana
Zulassungsjahr:	2013
Reifegruppe:	Sehr früh
Anzahl Prüfungsjahre:	4



Sorte: ‚Sunshine‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	334 dt/ha 440 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,2 0,2 45,4 52,8 1,6
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,8 31,1 47,4 13,8
Stärkegehalt in % (13,3)	13,0
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	2 0 0 0 0 4
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 1,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,67 Platz: 14

Sorte: ‚Swing‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
langoval	tiefgelb	gelb	mehligkochend


Züchter:	Norika
Zulassungsjahr:	2015
Reifegruppe:	mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	3



Sorte: ‚Swing‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	274 dt/ha 446 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	9,0 1,4 64,4 34,2 0,0
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,7 24,2 56,7 11,5
Stärkegehalt in % (13,3)	15,8
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 1 8
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 0,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	4,13 Platz: 11

Sorte: ‚Torenia‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
Langoval	Gelb	Gelb	festkochend

Züchter:	Europlant
Zulassungsjahr:	2012
Reifegruppe:	Mittelfrüh
Anzahl Prüfungsjahre:	1



Sorte: ‚Torenia‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	305 dt/ha 491 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortiererergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	8,1 0,9 39,7 58,4 1,0
Endernte: Sortiererergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	7,5 20,3 54,8 17,6
Stärkegehalt in % (13,3)	11,5
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 2 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	2,0 3,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	2,33 Platz: 1

Sorte: ‚Wega‘ (1/2)



Knollenform*	Fleischfarbe*	Schalenfarbe*	Kochtyp*
oval	tiefgelb	gelb	vorwiegend festkochend

Züchter:	Norika
Zulassungsjahr:	2010
Reifegruppe:	früh
Anzahl Prüfungsjahre:	6



Sorte: ‚Wega‘ (2/2)

Ertrag: Zeiternte 17.07.2018 (Ø 283 dt/ha) Endernte 12.09.2018 (Ø 431 dt/ha)	255 dt/ha 397 dt/ha
Zeiternte: Durchschnittl. Knollenansatz/Staude (Ø 9) Sortierergebnisse 17.07.2018 in % < 35 mm (1,2) 35-50 mm (56,3) 50-65 mm (40,5) > 65 mm (2,1)	7,0 0,2 47,1 49,0 3,7
Endernte: Sortierergebnisse 12.09.2018 in % < 35 mm (8,3) 35-50 mm (31,7) 50-65 mm (46,9) > 65 mm (13,1)	8,4 23,3 52,4 15,9
Stärkegehalt in % (13,3)	11,0
Anzahl (von 100 Knollen): Wachstumsrisse Knollen: (1) Zweitwuchs Knollen: (4) Nassfäule Knollen: (0) Braunfäule Knollen: (0) Trockenfäule Knollen: (2) Anzahl grüne Knollen: (3)	0 0 0 0 0 0
Anzahl (von 100 Kn.) Schorf: Besatz in %: (0,8) Anzahl (von 100 Kn.) Rhizoctonia: Besatz in %: (1,0)	0,0 2,0
Note der Speiseprüfung 14.11.2018: (Note: Ø 4,23)	3,87 Platz: 8