

Beizmittel und Indikationen in Sommergetreide - zugelassene bzw. empfohlene Aufwandmengen (ml/dt)

Stand: 04.02.2019

| Präparate (Auswahl) | Wirkstoffe und -gehalte in g pro l | Sommergerste | | | | | | | | | | Sommerweizen | | | | | | Sommerroggen | | | Sommertriticale | | | | | Hafer | | Auflagen (fett= bußgeldbewehrt) | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------|
| | | Streifenkrankheit | Flugbrand | Hartbrand | Schneeschimmel | Netzflecken* | Echter Mehltau* | Rhynchosporium | Typhula-Fäule* | Fusarium-Arten | Schwarzbeinigkeit | Steinbrand | Schneeschimmel | Flugbrand | Zwergsteinbrand | Fusarium culmorum | Septoria nodorum | Schwarzbeinigkeit* | Schneeschimmel | Stängelbrand | Fusarium culmorum | Schneeschimmel | Stängelbrand | Steinbrand | Zwergsteinbrand | Fusarium culmorum | Schwarzbeinigkeit | | Flugbrand | Fusarium-Arten |
| Arena C | Tebuconazol 5 + Fludioxonil 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | NH677/679 |
| Baytan 3 | Fluopyram 5 + Prothioconazol 25 + Triadimenol 187,5 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NH677/678/679/680 | |
| Celest | Fludioxonil 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | 150 | 150 | - | 150 - 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Defend Extra | Difenoconazol 25 + Fludioxonil 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | NH677/678/680 | |
| EfA | Tebuconazol 3,75 + Fluoxastrobin 37,5 + Prothioconazol 25 + Triazoxid 10 | 160 | 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | 120 | - | 100 | - | NH677/678 | |
| Landor CT | Tebuconazol 5 + Difenconazol 20 + Fludioxonil 25 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | NH677/679 | |
| Latitude | Silthiofam 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200* | - | - | - | |
| Latitude XL | Silthiofam 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | NH677/680/681/682 | |
| Orius Universal | Tebuconazol 15 + Prochloraz 60 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | 150 | - | NH677/679 | |
| Rubin TT | Prochloraz 38,6 + Pyrimethanil 42 + Triticonazol 25 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | |
| Toledo | Fluoxastrobin 37,5 + Prothioconazol 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | - | 120 | 120 | - | 120 | - | - | - | 150 | - | - | - | NH677/678 | |
| Zardex G | Imazalil 20 + Cyproconazol 5 | 250 -300 | 250 -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | NH677/679 | |

* nur zur Befallsminderung

Neue bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen zum Gesundheitsschutz: bei Latitude XL siehe Gebrauchsanleitung

Erläuterungen zur Tabelle Beizmittel in Sommergetreide:

rot / fett = bußgeldbewehrt

- NH677/**NH677** Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Verschüttetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen."
- NH678 Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das Mittel ist giftig für Kleinsäuger; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden."
- NH679 Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das Mittel ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. Vor dem Ausheben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden."
- NH680/**NH680** Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Behandeltes Saatgut und Reste wie Bruchkorn und Stäube, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle."
- NH681** Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Keine Ausbringung des behandelten Saatgutes bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s."
- NH682** Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das behandelte Saatgut einschließlich enthaltener oder beim Sävorgang entstehender Stäube vollständig in den Boden einbringen."