

Wirksamkeit ausgewählter Fungizide im Winterroggen

++++ = sehr gute Wirkung +++ = gute Wirkung ++ = befriedigende Wirkung + = mäßige Wirkung () = Einschränkung - = keine Wirkung

Stand: Dezember 2025

Präparat	Wirkstoffe und -gehalte in g/l bzw. g/kg	max. zugel. Aufwand- menge /ha	Halm- bruch	Echter Mehltau	<i>Rhyncho- sporium</i> - Blattflecken	Braun- rost	Abstand in m zu Oberflächengewässern Abdriftminderungs- klasse				Abstand zu Saum- biotopen (NT- Auflagen)	Rand- streifen in m bei > 2 % Hangneigung
							Standard	50 %	75 %	90 %		
Mehltau-Spezialfungizide												
Flexity	Metrafenone 300	0,5 l	++	++++	-	-	x	x	x	x	-	-
Unix	Cyprodinil 750	1,0 kg	++	+++	-	-	15	10	5	5	-	NW706 (20m)
Kombi-Präparate Schwerpunkt Echter Mehltau												
Forapro	Prothioconazol 175 + Fenpropidin 250	1,0 l	+	++++	+++	+(+)	nz.	15	10	5	-	NW706 (20m)
Input Classic	Prothioconazol 160 + Spiroxamine 300	1,25 l	+	++++	+++	+(+)	nz.	20	15	15	-	NW706 (20m)
Input Triple	Prothioconazol 160 + Spiroxamine 200 + Proquinazid 40	1,25 l	+	++++	+++	+(+)	nz.	15	15	10	-	NW706 (20m)
Verben	Prothioconazol 200 + Proquinazid 50	1,0 l	+	++++	+++	+(+)	5	x	x	x	-	-
Pronto Plus	Tebuconazol 133 + Spiroxamine 250	1,5 l	-	++++	+(+)	+(+)	nz.	20	15	15	NT101	NW706 (20m)
Kombi-Präparate Schwerpunkt Blattkrankheiten ab dem Fahrenblattstadium												
Elatus Era	Benzovindiflupyr 75 + Prothioconazol 150	1,0 l	+	+++	+++(+)	+++(+)	15	10	5	5	-	-
Maxentis	Azoxystrobin 200 + Prothioconazol 150	1,0 l	+	+++	+++	+++	5	x	x	x	-	-
Pioli + Soratel	Fluxapyroxad 62,5 + Prothioconazol 250	1,6 l + 0,8 l*	+	+++	++++	+++(+)	5	x	x	x	-	-
Priaxor	Fluxapyroxad 75 + Pyraclostrobin 150	1,5 l	+	+++	+++(+)	+++	10	5	5	x	-	-
Revytrex	Fluxapyroxad 66,7 + Mefentrifluconazol 66,7	1,1 l	+	+++	+++(+)	+++	5	5	x	x	-	-
Univoq	Fenpicoxamid 50 + Prothioconazol 100	1,5 l	+	+++	+++(+)	+++	nz.	15	10	5	-	NW706 (20m)
Azolfungizide												
Caramba	Metconazol 60	1,5 l	-	+++	+(+)	+(+)	5	5	5	x	-	-
Orius	Tebuconazol 200	1,5 l	-	+++	+(+)	++	10	5	5	x	-	NW701 (10m)
Protendo 250 EC	Prothioconazol 250	0,8 l	+	+++	+++	+(+)	10	5	5	x	-	NW706 (20m)
Strobilurin-haltige Fungizide												
Amistar	Azoxystrobin 250	1,0 l	-	+	(+)	++	5	x	x	x	-	-
Comet	Pyraclostrobin 200	1,25 l	-	+	+(+)	++	15	10	5	5	-	-

nz. = nicht zugelassen

LKSH, Dezember 2025

Bemerkungen: * Maximale Aufwandmenge an die Zusammensetzung des Avastel Packs angepasst.

x = Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist der länderspezifische Mindestabstand von 1 m an Gewässern nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten. Im Rahmen der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist ab 2023 ein 3 m breiter Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 4) einzuhalten. In gewässerreichen Gemeinden darf der Abstand auf 1 m verringert werden (Landesverordnung; siehe wichtige Hinweise zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln).