

Glyphosat-Einsatz - Ackerbau und Grünland (Gesamtübersicht)

Stand: 22.04.2021

Indikationen			360 g/l-Glyphosat-Präparate							450 g/l-G.	480 g/l-Glyphosate		720 g/kg	240 g/l Gly. + 160 g/l 2,4 D
Kulturen	Schadorganismus / Indikation	Einsatzgebiet / Einsatztermin	Boom effekt [NG352]	Barclay Gallup Biograde 360 / Barbarian Biograde 360 / Plantactean Label XL * [NG352]	Clinic TF / Omega 360 / Lotus Clinic Top / Nufosate [NG352]	Glyfos TF Classic [NG352]	Durano TF / Landmaster TF / Rosate 360 TF [NG352]	Taifun forte / Profi 360 TF [NG352]	Touchdown Quattro [NG352]	Helosate 450 TF [NG352]	Dominator 480 TF / Landmaster Supreme 480 TF/ Rosate Supreme 480 TF [NG352]	Roundup PowerFlex [NG352]	Roundup Rekord [NG352]	Kylec** [NG352-1]
max. zugelassene Aufwandmenge in l oder kg/ha (Tage Wartezeit) [besondere Auflagen]														
Ackerbaukulturen allgemein:														
Ackerbaukulturen	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	nach der Ernte oder nach dem Wiedereergrünen	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG404]	-	5,0 [NG402]	4,0	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	5,0 [NG405]
	Ausfallkulturen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gem. Quecke	Stoppelbehandlung; Herbst nach der Ernte	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ackerbaukulturen	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat	-	-	-	3,0	-	5,0 [NG404]	-	-	2,25	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	-
		bis 5 Tage nach der Saat (ausgen. Raps)	-	-	-	3,0	-	-	-	-	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5*** [NG402]	-
Ackerbaukulturen	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter (schwer bekämpfbare Unkräuter); Einzelpflanzenbehandlung	während der Vegetationsperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33% (max. 5 kg/ha)	-
Getreide:														
Getreide (lagernd; WA700 + WA701) ausgen. Saat- u. Braugetreide	nur auf Teilflächen zulässig, wenn aufgrund von Unkrautdurchwuchs eine Beerntung nicht möglich ist.	Spätbehandlung; bis 7-14 Tage vor der Ernte	-	5,0* (7 T.) [VW835]	5,0 (7 T.) [VW835]	5,0 (14 T.) [VW835]	5,0 (14 T.) [VW835]	5,0 (7 T.) [VW835]	5,0 (14 T.) [VW835]	4,0 (7 T.) [VW835]	3,75 (7 T.) [VW835]	3,75 (7T) [VW835]	2,5 (7T) [VW835]	-
Getreide (lagernd oder stehend; WA700 + WA702) ausgen. Saat- u. Braugetreide	nur auf Teilflächen zulässig, wenn aufgrund von Zwiewuchs eine Beerntung nicht möglich ist.	Spätbehandlung; bis 7-14 Tage vor der Ernte	-	5,0* (7 T.) [VW835]	-	5,0 (14 T.) [VW835]	5,0 (14 T.) [VW835]	5,0 (7Tg) [VW835]	5,0 (14 T.) [VW835]	-	-	-	2,5 (7T) [VW835]	-
Getreidestoppel	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	nach der Ernte oder nach dem Wiedereergrünen	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG404]	-	5,0 [NG402]	4,0	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	5,0 [NG405]
	Ausfallkulturen		-	-	-	-	-	5,0 [NG404]	-	-	-	-	-	
	Gem. Quecke		-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Getreide	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat	-	-	-	3,0	-	5,0 [NG404]	-	-	2,25	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	5,0** [NG405]
		bis 5 Tage nach der Saat	-	-	-	3,0	-	-	-	-	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	-

Glyphosat-Einsatz - Ackerbau und Grünland (Gesamtübersicht)

Stand: 22.04.2021

Indikationen			360 g/l-Glyphosat-Präparate								450 g/l-G.	480 g/l-Glyphosate		720 g/kg	240 g/l Gly. + 160 g/l 2,4 D
Kulturen	Schadorganismus / Indikation	Einsatzgebiet / Einsatztermin	Boom efekt [NG352]	Barclay Gallup Biograde 360 / Barbarian Biograde 360 / Plantactean Label XL * [NG352]	Clinic TF / Omega 360 / Lotus Clinic Top / Nufosate [NG352]	Glyphos TF Classic [NG352]	Durano TF / Landmaster TF / Rosate 360 TF [NG352]	Taifun forte / Prof. 360 TF [NG352]	Touchdown Quattro [NG352]	Helosate 450 TF [NG352]	Dominator 480 TF / Landmaster Supreme 480 TF/ Rosate Supreme 480 TF [NG352]	Roundup PowerFlex [NG352]	Roundup Rekord [NG352]	Kyleo** [NG352-1]	
max. zugelassene Aufwandmenge in l oder kg/ha (Tage Wartezeit) [besondere Auflagen]															

Leguminosen:														
Ackerbohne + Futtererbse (ausgen. zur Saatguterzeugung)	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	Spätbehandlung; bis 7-14 Tage vor der Ernte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 (7 T.)	2,0 (7 T.)	-
Lupine-Arten (ausgen. zur Saatguterzeugung) [WA703]	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	Spätbehandlung; 14 Tage vor der Ernte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75* (7 T.)	-	-
Klee-Arten, Luzerne-Arten, Wicken zur Saatguterzeugung*	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter; Horst- oder Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät	während der Vegetationsperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33% (max. 3,75 l/ha) (14T)	-	-
Leguminosen	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat	-	-	-	3,0	-	5,0 [NG404]	-	-	2,25	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	-
		bis 5 Tage nach der Saat	-	-	-	3,0	-	-	-	-	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	-
	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter Ausfallkulturen	nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG402]	5,0	5,0 [NG404]	-	5,0 [NG402]	4,0	3,75 [NG404]	3,75 [NG402]	2,5 [NG402]	5,0 [NG405]
	Gem. Quecke	Stoppelbehandlung; Herbst nach der Ernte	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Grünland:														
Wiesen und Weiden	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	vor der Saat; mit nachfolgendem Umbruch	-	4,0 [VW549]	-	4,0 [VW549]	4,0 [NG402]	-	-	4,0 [VW549]	3,0 (14 T.) [NG402, VW549]	3,75 [NG402, VW549]	2,5 [NG402, VW549]	-
	Gem. Quecke, Ampfer-Arten		-	-	4,0 [NG412, VW549]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ackerkratzdistel, Ampfer-Arten; Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät	während der Vegetation	-	-	-	-	33% (max. 4 l/ha) (14 T.)	-	-	-	25% (max. 7,5 l/ha) (14 T.) [VW549]	33% (max. 3,75 l/ha) (14 T.)	-	-

sonstige:														
Gräser zur Saatguterzeugung	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter; Horst- oder Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät	Frühjahr bis Frühsommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33% (max. 3,75 l/ha) (14 T.)	-	-
Lein (ausgen. zur Saatguterzeugung)	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	Spätbehandlung; bis 14 Tage vor der Ernte	-	4,0 (14 T.)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0 (14 T.)	-
Stilleungsflächen (Rekultivierung)	Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter	vor der Saat von Folgekulturen; während der Vegetationsperiode; zur Kulturvorbereitung	-	5,0 [VW549]	5,0 [NG402, VW549]	5,0 [VW549]	5,0 [VW549]	5,0 [NG404, VW549]	-	-	3,75 [NG404, VW549]	3,75 [NG402, VW549]	2,5 [NG402, VW549]	-

x = Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern an gewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist die Länderregelung nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten! Es gilt der länderspezifische Mindestabstand von 1m.

* = Art. 51-Zulassung (geringfügige Verwendung); T. = Tage; (14 T.) = 14 Tage Wartezeit; * = nicht in Roggen und Triticale! ** = Getreide bis max. 3 Tage vor der Saat; Mais bis max. 1 Tag vor der Saat; *** = auch im Raps

LKSH, Stand: 22.04.2021