

Wirksamkeit ausgewählter Frühjahrs-Herbizide im Wintergetreide

		+++ = sehr gute bis gute Wirkung		++ = befriedigende Wirkung		+ = mäßige Wirkung		() = Einschränkung		- = keine Wirkung		Stand: Dezember 2025															
Präparat	Wirkstoffe und -gehalte in g/l bzw. g/kg	Aufwand- menge /ha	Winterweizen	Wintergerste	Winterroggen	Wintertriticale	Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Einjähriges Rispengras	Klettenlabkraut	Vogelmiere	Kamille	Ackerstiefmütterchen	Ausfallraps	Ehrenpreis	Storchschnabel	Hundskerbel	Taubnessel	Kornblume	Abstand in m zu Oberflächengewässern Abdriftminderungs-				Abstand zu Saumbiotopen NT- Auflagen	NW 800	Rand- streifen in m bei > 2 % Hangneigung	
																				Stan- dard	50%	75%	90%				
- Schwerpunkt Gräser -																											
Atlantis Flex + FHS	Mesosulfuron-methyl 47 + Propoxycarbazone 67,5 + Mefenpyr 90	330 g + 1,0 l	x		x		+++ ¹	++(+)	+++	-	++	++(+)	-	+++	+	-	-	-	-	5	5	x	x	NT103	ja	NW701 (10m)	
		200 g + 0,6 l	x	x	x		++ ¹	++(+)	++	-	++(+)	+	-	++(+)	(+)	-	-	-	-	5	x	x	x	NT103	ja	-	
Avoxa	Pinoxaden 33,3 + Pyroxulam 8,33 + Cloquintocet-Mexyl 8,33	1,8 l	x	x	x		++ ¹	+++	++	++(+)	++(+)	(+)	++	+++	++	++(+)	(+)	-	-	5	5	5	x	NT109	-	-	
		1,35 l	x	x	x		++(+) ¹	++(+)	++(+)	++	++(+)	(+)	++(+)	+++	++	++(+)	(+)	-	-	5	5	5	x	NT109	-	-	
Axial 50	Pinoxaden 50 + Cloquintocet-Mexyl 12,5	1,2 l	x	x	x	x	++(+) ¹	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	NT101-1	-	-	
		0,9 l	x	x	x	x	-	++(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	
Altivate 6 WG + FHS	Mesosulfuron-methyl 60	0,25 l	x				+++ ¹	++(+)	++(+)	-	++	++(+)	-	+++	-	-	-	-	-	5	x	x	x	-	-	NW701 (10 m)	
		0,15 l	x	x	x		++(+)	++(+)	++	-	++(+)	+	-	++(+)	-	-	-	-	-	5	x	x	x	-	-	NW701 (10 m)	
Broadway Plus + FHS	Florasulam 80 + Pyroxulam 240 + Halauxifen-methyl 83,4	60 g + 1,0 l	x		x	x	++(+) ¹	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	+++	++(+)	n.z.	5	10	15	NT 108	-	NW706 (20m)	
Husar Plus + Mero	Iodosulfuron-methyl-natrium 50 + Mefenpyr-diethyl 250 + Mesosulfuron-methyl 7,8	0,2 l + 1,0 l	x		x	x	-	++	++(+)	++(+)	+++	+++	+	+++	++(+)	+	-	++	++(+)	5	x	x	x	NT103	ja	-	
Edaptis	Mesosulfuron-methyl 12 + Pinoxaden 60	1,0 l	x		x	x	+++	+++	+++	-	++	++(+)	-	+++	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	
Niantic + FHS	Iodosulfuron-methyl 6 + Mefenpyr-diethyl 90 + Mesosulfuron-methyl 30	500 g + 1,0 l	x				+++ ¹	++(+)	+++	++	+++	+++	-	+++	++(+)	-	-	-	-	x	x	x	x	NT109	ja	NW701 (10m)	
- Schwerpunkt Unkräuter ALS-Hemmer -																											
Antarktis	Bifenox 480 + Florasulam 5	1,2 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	+++	++	+++	++(+)	+	+	++	++	n.z.	n.z.	n.z.	20	NT108	-	-	
Artus	Metsulfuron-methyl 100 + Carfentrazone-ethyl 400	50 g	x	x	x	x	-	-	-	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+	5	x	x	x	NT102	-	-	
Concert SX	Metsulfuron-methyl 40 + Thifensulfuron-methyl 400	150 g	x		x	x	-	++	++(+)	++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+	5	5	5	x	NT108	ja	NW706 (20m)	
Dirigent SX	Metsulfuron-methyl 142,8 + Tribenuron-methyl 143	35 g	x	x	x	x	-	-	-	+	+++	++(+)	++(+)	+++	-	++	++	++(+)	++(+)	5	x	x	x	NT103	-	NW701 (10m)	
Omnera LQM	Metsulfuron-methyl 5 + Thifensulfuron-methyl 30 + Fluroxypyr 135	1,0 l	x	x	x	x	-	(+)	(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	15	10	5	5	NT109	ja	NW701 (10m)	
Pointer SX / Trimmer SX	Tribenuron-methyl 500	60 g	x	x	x	x	-	-	-	++(+)	+++	+++	++	+++	+	+	+	+++	++	x	x	x	x	NT103	-	-	
Pointer Plus	Tribenuron-methyl 83 + Florasulam 105 + Metsulfuron-methyl 82,8	50 g	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++(+)	++	+++	++(+)	5	5	x	x	NT108	-	-	
Primus Perfect	Florasulam 25 + Clopyralid 300	0,2 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	+++	-	+++	+	++(+)	-	-	+++	5	x	x	x	NT103	-	-	
Refine Extra SX	Tribenuron-methyl 166 + Thifensulfuron-methyl 333	60 g	x	x	x	x	-	-	-	+	+++	+++	++	+++	-	++	+++	++	++	5	x	x	x	NT103	-	NW701(10m)	
Saracen	Florasulam 50	0,1 - 0,15 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	++(+)	-	+++	+	+	-	-	++(+)	x	x	x	x	NT109	-	-	
- Schwerpunkt Unkräuter Wuchsstoffe -																											
Ariane C	Fluroxypyr 100 + Clopyralid 80 + Florasulam 2,5	1,5 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	+++	-	+++	-	++	+	+	+++	x	x	x	x	NT103	-	-	
Duplosan Super	MCPA 160 + Dichlorprop-P 310 + Mecoprop-P 130	2,5 l	x	x	x	x	-	-	-	++(+)	+	-	-	+++	++(+)	++	++(+)	+	+	5	5	5	x	NT109	NG 403	NW706 (20m)	
Pixxaro EC	Halauxifen-methyl 12,5 + Fluroxypyr 280 + Cloquintocet-Mexyl 12	0,5 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	-	-	-	-	++(+)	-	++(+)	++	10	5	5	x	NT103	-	NW706 (20m)	
Tomigan 200	Fluroxypyr 200	0,9 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	-	-	-	-	+	+	++(+)	-	x	x	x	x	NT108	-	-	
U 46 M-Fluid	MCPA 500	1,4 l	x	x	x	x	-	-	-	+	+	-	-	++	-	++(+)	+	-	++	x	x	x	x	NT108	-	-	
Zypar	Florasulam 5 + Halauxifen-methyl 6,25 + Cloquintocet-Mexyl 5,58	1,0 l	x	x	x	x	-	-	-	+++	+++	+++	-	+++	-	+++	-	+++	++(+)	10	5	5	x	NT102	-	NW706 (20m)	

Bemerkungen: Minderung der Wirkung bei Kamille beim Einsatz von Sulfonylharnstoffen durch Resistenz möglich! Dash E.C. und Mero = Formulierungshilfsstoffe (FHS) LKSH, Dezember 2025

¹ = Minderung der Wirkung durch Resistenz möglich! nz. = nicht zugelassen

x = Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist der länderspezifische Mindestabstand von 1 m an Gewässern nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten. Im Rahmen der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist ab 2023 ein 3 m breiter Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 4) einzuhalten. In gewässerreichen Gemeinden darf der Abstand auf 1 m verringert werden (Landesverordnung; siehe wichtige Hinweise zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln).