

Wirksamkeit ausgewählter Frühjahrs-Herbizide im Winterraps

+++ = sehr gute bis gute Wirkung ++ = befriedigende Wirkung + = mäßige Wirkung () = Einschränkung - = keine Wirkung

Stand: November 2025

Präparat	Wirkstoffe und -gehalte in g/l bzw. g/kg	Aufwand- menge /ha	Einsatz- termin	Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Ausfallgetreide	Hirtenäschelkraut	Ackerhellerkraut	Wegrauke	Klettenlabkraut	Kamille	Vogelmiere	Storchschnabel	Ackerstief- mütterchen	Kornblume	Klatschmohn	Ackerkrummhals	Gefleckter Schierling	Krause Distel	Abstand in m zu Oberflächengewässern				Abstand zu Saum- biotopen (NT- Auflagen)	Rand- streifen in m bei > 2 % Hangneigung
																				Abdriftminderungs- klasse					
																				Stan- dard	50%	75%	90%		
- Anwendung im Nachauflauf im Frühjahr (NAF) -																									
Effigo	Picloram 67 + Clopyralid 267	0,35 l	NAF (bis ES 50)	-	-	-	-	-	-	++(+)	++(+)	-	-	-	+++	-	-	+	++(+)	x	x	x	x	NT101	-
Korvetto	Clopyralid 120 + Halauxifen-methyl 5	1,0 l	NAF (bis ES 50)	-	-	-	+	+++	(+)	+++	++(+)	-	+++	-	+++	+(+)	++	+++	5	5	5	x	NT103	-	
Lontrel 600	Clopyralid 600	0,2 l	NAF (bis ES 50)	-	-	-	-	-	-	-	++(+)	-	-	-	+++	-	-	++	+++	x	x	x	x	NT102	-

Bemerkungen: NAF = Nachauflauf Frühjahr

LKSH, November 2025

x = Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist der länderspezifische Mindestabstand von 1 m an Gewässern nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten. Im Rahmen der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist ab 2023 ein 3 m breiter Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 4) einzuhalten. In gewässerreichen Gemeinden darf der Abstand auf 1 m verringert werden (Landesverordnung; siehe wichtige Hinweise zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln).