Ausgabe 06	Thiensen 22	Telefon: 04120 7068-200
13. Mai 2022	25373 Ellerhoop	Telefax: 04120 7068-212

1 Zulassungen gemäß Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 - Notfallsituation

Nach Art. 53 der Zulassungsverordnung wurden die in der Tabelle aufgeführten Indikationen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als Notfall für einen begrenzten Zeitraum zugelassen.

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Quassia-extrakt MD *8-17 g/kg Quassin* Zulassung: **05.04.** bis **02.08.2022** Menge: 1.950 kg Fläche: Kernobst:900 ha Steinobst: 70 ha	**Kernobst, Steinobst** *(Freiland, ökologischer Anbau)*	**Sägewespen**	Zeitpunkt:	BBCH 64-69. Nach Erreichen von Schwellenwerten oder Warndienstaufruf; vor Larvenschlupf
			Aufwandmenge:	1,5 kg/ha in 1000 l Wasser/ha; entspricht einer Quassin-Konzentration von 12 g/ha bei einem angenommenen Quassingehalt von 8 g/kg für das Quassiaextrakt MD. Die maximale Quassin-menge von 12 g/ha darf nicht überschritten werden. Bei einer höheren Quassinkonzentra-tion im Produkt ist die Aufwandmenge entsprechend zu reduzieren.
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Sprühen
			Wartezeit:	F
			Anwendungs-bestimmungen:	**NT102:** 20 m 75 % **NW642-1:** länderrechtlicher Mindestabstand
			Auflagen/ Hinweise:	**B4**
Isonet Z *70-90 Gew.-% (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-ylacetat* *< 5 Gew.-% (E,Z)-3.13-Octadecadien-1-ylacetat* Zulassung: **26.04.** bis **24.08.2022** Menge: 66.000 Dispenser Fläche: 200 ha	**Johannis-beere, Stachel-beere** *(Freiland)*	**Johannisbeer Glasflügler** *(Synanthedon tipuliformis)*	Zeitpunkt:	Ab BBCH 71; vor Flugbeginn des Falterfluges und nach Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	330 Dispenser/ha
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Ausbringen von Dispensern
			Wartezeit:	F
			Anwendungs-bestimmungen:	
			Auflagen/ Hinweise:	**B4**

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Insegar *250 g/kg Fenoxycarb* Zulassung: **15.05.** bis **11.09.2022** Menge: 5.400 kg Fläche: 4.500 ha	**Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode** *(Freiland)*	**Pflaumen-wickler** *(Cydia funebrana)*	Zeitpunkt:	BBCH 72-85; nach festgestelltem Befall und Warndienstaufruf gegen Eier und schlüpfende Larven
			Aufwandmenge:	0,2 kg/ha und je m Kronenhöhe (max. 0,6 kg/ha) in max. 500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Maximal 1,2 kg/ha (bei 2 Behandlungen)
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von mindestens 14 Tagen
			Technik:	Sprühen
			Wartezeit:	28 Tage
			Anwendungs-bestimmungen:	**NT unkodiert:** 5 m, zusätzlich 20 m 95 % Abdriftminderung **NW607-**1**:** 90 % 20 m **SF1891-**1**:** Wiederbetreten am Tag der Applikation nur mit vorgegebener persönlicher Schutzausrüstung. Nachfolgearbeiten erst nach 24 Stunden. Innerhalb von 48 Stunden nach Ausbringung Schutzanzug und Universal-Schutzhandschuhe tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten
Vertimec Pro *18 g/l Abamectin* Zulassung: **02.05.** bis **28.08.2022** Menge: 600 l Fläche: 800 ha	**Birne** *(Freiland)*	**Birnenblatt-sauger** *(Cacopsylla pyri)*	Zeitpunkt:	Ab Blühende (BBCH 69-71) nach Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha und je m Kronenhöhe (max. 0,75 l/ha) in max. 500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Sprühen
			Wartezeit:	28 Tage
			Anwendungs-bestimmungen:	**NT109:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 90 % **NW607-1:** 90 % 20 m, 95 % 15 m **NW705:** Bei Hangneigung > 2 % 5 m breiter Randstreifen oder Auffangsysteme **SF275-28OS:** Bei Nachfolgearbeiten innerhalb von 28 Tagen nach Anwendung lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten NN3002: Schädigt relevante Raubmilben und Spinnen
ABC V14 *$3x10^{13}$ OB/L Cydia pomonella Granulosevirus Isolat V14* Zulassung: **10.05.** bis **06.09.2022** Menge: 460 l Fläche: 368 ha	**Kernobst** *(Freiland)* *ökologisch wirtschaftende Betriebe mit nachgewiese-nen Resistenz-problemen*	**Apfelwickler** *(Cydia pomonella)*	Zeitpunkt:	Ab Schlüpfen der ersten Larven
			Aufwandmenge:	50 ml/ha und je m Kronenhöhe in max. 400 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe (max. 2,5 m Kronenhöhe)
			Zahl der Behandlungen:	10 (max. in der Kultur/Jahr: 10) im Abstand von maximal 8 sonnigen Tagen
			Technik:	Spritzen
			Wartezeit:	F
			Anwendungs-bestimmungen:	**NW642-1:** länderrechtlicher Mindestabstand
			Auflagen/ Hinweise:	**B4**

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: Süßkirsche, Sauerkirsche: **01.05.** bis **28.08.2022** Menge: 15.925 l Fläche: 6.100 ha Süß-, Sauerkirschen (400 ha in Wasserschutzgebieten)	**Süßkirsche, Sauerkirsche** *(Freiland, **außerhalb** von Wasserschutzgebieten)*	**Kirschfruchtfliege** *(Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)* **Kirschessigfliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall bzw. Auftreten der Kirschessigfliege bei fortgeschrittener Fruchtausfärbung bis Pflückreife
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha und je m Kronenhöhe in 250-500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Max. 1 l/ha je Behandlung; Max. 2 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von mindestens 7 Tagen
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	7 Tage
			Anwendungsbestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT1095:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 95 % **NW605-1:** 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % * **NW606:** 20 m **SF276-14OS:** Bei Nachfolgearbeiten innerhalb von 14 Tagen nach Anwendung lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen **SF278-3OS:** Die Arbeitszeit ist innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt. Lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: Süßkirsche, Sauerkirsche: **01.05.** bis **28.08.2022** Menge: 15.925 l Fläche: 6.100 ha Süß-, Sauerkirschen (400 ha in Wasserschutzgebieten)	**Süßkirsche, Sauerkirsche** *(Freiland, **innerhalb** von Wasserschutzgebieten)*	**Kirschfruchtfliege** *(Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)* **Kirschessigfliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall bzw. Auftreten der Kirschessigfliege bei fortgeschrittener Fruchtausfärbung bis Pflückreife
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha und je m Kronenhöhe in 250-500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Max. 1 l/ha je Behandlung; Max. 1 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	7 Tage
			Anwendungsbestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT1095:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 95 % **NW605-1:** 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % * **NW606:** 20 m **SF276-14OS:** Bei Nachfolgearbeiten innerhalb von 14 Tagen nach Anwendung lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen **SF278-3OS:** Die Arbeitszeit ist innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt. Lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich: **15.06.** bis **12.10.2022** Menge: 15.925 l Fläche: 2.900 ha Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich (300 ha in Wasser-schutzgebieten)	**Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich** *(Freiland, **außerhalb** von Wasserschutz-gebieten)*	**Kirschessig-fliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall bzw. Auftreten der Kirschessigfliege bei fortgeschrit-tener Fruchtausfärbung bis Pflückreife
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha und je m Kronenhöhe in 250-500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Max. 0,75 l/ha je Behandlung; Max. 1,5 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von mindestens 7 Tagen
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	7 Tage
			Anwendungs-bestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT1095:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 95 % **NW605-1:** 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % * **NW606:** 15 m **SF276-14OS:** Bei Nachfolgearbeiten innerhalb von 14 Tagen nach Anwendung lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen **SF278-3OS:** Die Arbeitszeit ist innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt. Lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich: **15.06.** bis **12.10.2022** Menge: 15.925 l Fläche: 2.900 ha Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich (300 ha in Wasser-schutzgebieten)	**Pflaume, Zwetsche, Reneklode, Mirabelle, Pfirsich** *(Freiland, **innerhalb** von Wasserschutz-gebieten)*	**Kirschessig-fliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall bzw. Auftreten der Kirschessigfliege bei fortgeschrit-tener Fruchtausfärbung bis Pflückreife
			Aufwandmenge:	0,375 l/ha und je m Kronenhöhe in 250-500 l Wasser/ha und je m Kronenhöhe Max. 0,75 l/ha je Behandlung; Max. 0,75 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	7 Tage
			Anwendungs-bestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT1095:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 95 % **NW605-1:** 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % * **NW606:** 15 m **SF276-14OS:** Bei Nachfolgearbeiten innerhalb von 14 Tagen nach Anwendung lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen **SF278-3OS:** Die Arbeitszeit ist innerhalb von 3 Tagen nach der Anwendung auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt. Lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe tragen
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten

Mittel	Kultur	Schaderreger	Anwendungshinweise und Auflagen	
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: **15.05.** bis **11.09.2022** Menge: 1.800 l Fläche: 1.300 ha	**Rote, weiße und schwarze Johannisbeere; Heidelbeere** *(Freiland, **außerhalb** von Wasserschutzgebieten)*	**Kirschessigfliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall und Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	0,75 l/ha in mindestens 600 l Wasser/ha; Maximal 1,5 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	2 (max. in der Kultur/Jahr: 2) im Abstand von mindestens 3 Tagen
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	3 Tage
			Anwendungsbestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT1095:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 95 % **NW605-1:** 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * **NW606:** 10 m
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten
Exirel *100 g/l Cyantraniliprole* Zulassung: **15.05.** bis **11.09.2022** Menge: 1.800 l Fläche: 1.300 ha	**Rote, weiße und schwarze Johannisbeere, Heidelbeere** *(Freiland, **innerhalb** von Wasserschutzgebieten)*	**Kirschessigfliege** *(Drosophila suzukii)*	Zeitpunkt:	BBCH 81-87, nach festgestelltem Befall und Warndienstaufruf
			Aufwandmenge:	0,75 l/ha in mindestens 600 l Wasser/ha; Maximal 0,75 l/ha in der Kultur/Jahr
			Zahl der Behandlungen:	1 (max. in der Kultur/Jahr: 1)
			Technik:	Spritzen oder sprühen
			Wartezeit:	3 Tage
			Anwendungsbestimmungen:	**NG364:** Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die Cyantraniliprole enthalten **NT109:** Abstand 5 m, zusätzlich 20 m 90 % **NW605-1:** 50 % 5 m, 75 % *, 90 % * **NW606:** 10 m
			Auflagen/ Hinweise:	**B1** NN3001: Schädigt relevante Nutzinsekten

3 Verlängerungen von Pflanzenschutzmittelzulassungen

Folgende Zulassungen (und ggf. deren Vertriebserweiterungen) wurden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nach Artikel 43 Abs. 6 der Verordnung EG Nr. 1107/2009 verlängert:

Mittel	**Wirkstoff**	**Zulassungs-nummer**	**Verlängerung bis:**	**Verwendung in:**
Metarex M	Metaldehyd	007825-00	31.05.2024	Beerenobst
Metarex Inov	Metaldehyd	007828-00	31.05.2024	Beerenobst
Delan Pro	Dithianon, Kaliumphosphonat	008018-00	31.05.2025	Apfel, Birne, Quitte, Johannisbeere, Stachelbeere
LIMA ORO 3	Metaldehyd	008404-00	31.05.2024	Beerenobst (Ausgenommen: Erdbeere)
Slug-Off	Metaldehyd	008482-00	31.05.2024	Beerenobst
Flint	Trifloxystrobin	024657-00	30.06.2023	Kernobst, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume, Pfirsich, Aprikose, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere

Bei den Anwendungsbestimmungen und Kennzeichnungsauflagen handelt es sich um eine Auswahl. Die vollständigen Angaben sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen. Grundsätzlich dürfen behandelte Flächen erst nach Abtrocknung des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort:

Name	Telefonnummer	E-Mail Adresse
Merle Peters	04120 7068-216 0170 6111612	mpeters@lksh.de
Claudia Willmer	04120 7068-208	cwillmer@lksh.de

Allgemeiner Hinweis:
Die Hinweise in diesem Warndienst/Hinweis ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.
Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit.
© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet.