

LSV Ackerbohnen 2021

Proteingehalte in %

im Anbaugebiet Küstenregionen

* = Verrechnungssorten



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

	Ort	Futterkamp	Loit	Kastorf	Barlt	Lindenhof	Lindenhof	Hohenlieth	Mittel			
		sL/60	IS/55	sL/51		sL/ 50	sL/50	sL/ 46	2021	2020	2019	2018
	Boden	23. Mrz	25. Mrz	25. Mrz	24. Mrz	09. Mrz	09. Mrz	02. Apr				
	Aussaat	24. Aug	26. Aug	06. Sep	31. Aug	01. Sep	26. Aug	26. Aug				
	Ernte											
	Sorte	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Mulch	Pflug				
Status	Mittel *	24,2	24,1	26,9	24,5	24,8	25,2	25,9	25,1	25,5	24,5	25,0
VRS	Fuego*	24,1	24,9	25,6	25,6	25,5	26,3	25,9	25,4	25,1	24,3	26,0
VRS	Fanfare*	25,7	23,9	27,5	24,1	24,5	26,7	24,6	25,3	25,3	25,2	26,1
VGL	Tiffany* v	26,2	24,8	27,0	24,9	26,8	26,3	28,3	26,3	25,9	25,8	24,1
VGL	Trumpet*	23,0	22,4	25,9	23,8	24,4	24,1	23,8	23,9	24,6	24,3	23,3
VGL	Taifun* t	23,3	24,7	28,5	24,7	24,6	26,6	26,5	25,6	25,9	25,1	25,6
LSV3	Macho*	22,5	21,2	25,6	22,5	22,6	23,5	24,3	23,2	23,9	22,6	-
LSV2	Stella*	25,9	24,2	25,5	25,1	26,2	26,9	26,7	25,8	26,3	-	-
LSV2	Daisy*	23,5	24,9	27,7	25,3	24,2	25,2	26,2	25,3	27,0	-	-
LSV2	Allison* v	24,3	26,8	26,8	24,9	25,9	24,7	26,0	25,6	25,5	-	-
LSV1	Capri	23,4	24,3	28,0	25,4	23,7	22,8	27,0	24,9	-	-	-

VRS/VGL= Bezugsbasis für EU- und Wertprüfungen. Im LSV wird über alles Sorten gemittelt.

t = tanninfrei, v= vicinarm

#: Sorte nicht Wertbar

Dr. Christian Kleimeier, LKSH 18.11.2021