

## Glyphosat-Einsatz - Ackerbau und Grünland (Gesamtübersicht)

Stand: 03.05.2018

Indikation		Schadorganismus	Einsatztermin	Auswahl												
				360 g/l-Glyphosat-Präparate						450 g/l - G.		480 g/l - G.		680 g/l	720g/l	240g/l G.
				Durano TF	Glyfos TF Classic	Plantaclean Label XL*	Omega 360 / Lotus Clinic Top	Taifun forte/Profi 360 TF	Touchdown Quattro	Helosate 450 TF	Glyfos Supreme	Dominator 480 TF	Roundup PowerFlex	Glyfos Dakar	Roundup Rekord	+ 160 g/l 2,4 D Kyleo**
<b>Getreide:</b>																
Getreide lagernd ausgen. Saat- u. Braugetreide	nur auf Teilflächen zulässig, wenn aufgrund von <u>Unkrautdurchwuchs</u> eine Beerntung nicht möglich ist.	Spätbehandlung bis 7-14 Tage vor der Ernte		5,0 (14Tg)	5,0 (14Tg)	5,0* (7Tg)	5,0 (7Tg)	5,0 (7Tg)	5,0 (14Tg)	4,0 (7Tg)	4,0 (7Tg)	3,75 (7Tg)	3,75 (7Tg)	2,65 (7Tg)	2,5 (7Tg)	-
Getreide lagernd oder stehend ausgen. Saat- u. Braugetreide	nur auf Teilflächen zulässig, wenn aufgrund von <u>Zwiewuchs</u> eine Beerntung nicht möglich ist.	Spätbehandlung bis 7-14 Tage vor der Ernte		5,0 (14Tg)	5,0 (14Tg)	5,0* (7Tg)	-	5,0 (7Tg)	5,0 (14Tg)	4,0 (7Tg)	4,0 (7Tg)	3,75 (7Tg)	3,75 (7Tg)	2,65 (7Tg)	2,5 (7Tg)	-
Getreidestoppel	Quecke, Ausfallgetreide	nach der Ernte / Herbst		-	5,0	-	-	5,0	-	-	4,0	-	-	2,65	-	-
Getreide	Ungräser + Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat		-	3,0	-	-	-	-	-	2,4	2,25	3,75	1,6	2,5	5,0**
Getreide	Ungräser + Unkräuter	VA bis 5 Tage nach der Saat		-	3,0	-	-	-	-	-	2,4	3,75	3,75	1,6	2,5	-
<b>Raps</b>																
Raps ausgen. zur Saatguterzeugung	Sikkation Ungräser + Unkräuter	Spätbehandlung bis 7-14 Tage vor der Ernte		-	-	4,0 (7Tg)	-	-	-	-	-	3,0 (7Tg)	3,0 (7Tg)	-	2,0 (7Tg)	-
Winterraps ausgen. zur Saatguterzeugung	Sikkation Ungräser + Unkräuter	Spätbehandlung 14 Tage vor der Ernte		-	-	-	-	-	-	2,5 (14Tg)	-	-	-	-	-	-
Brassica-Arten (Ackerbaukulturen), Senf-Arten ausgen. Saatguterzeugung	Sikkation Ungräser + Unkräuter	Spätbehandlung bis 14 Tage vor der Ernte		-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 (7Tg)	-	2,0 (7Tg)	-	
Rapsstoppel	Ungräser + Unkräuter	nach der Ernte / Herbst		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,75	3,75	2,65	2,5	5,0
<b>Leguminosen:</b>																
Ackerbohne / Futtererbse ausgen. zur Saatguterzeugung	Sikkation Ungräser + Unkräuter	Spätbehandlung bis 14 Tage vor der Ernte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 (7Tg)	-	2,0 (7Tg)	-
Lupine-Arten ausgen. zur Saatguterzeugung	Sikkation, Ungräser + Unkräuter	Spätbehandlung 14 Tage vor der Ernte		-	-	-	-	-	-	-	-	3,75° (7Tg)	-	2,0 (7Tg)	-	
Klee-Arten, Luzerne-Arten, Wicken zur Saatguterzeugung°	Einzelpflanzenbeh. / streichen Ungräser + Unkräuter	während der Vegetationsperiode		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%° (max. 3,75 l/ha) (14Tg)	-	-	-
<b>Mais:</b>																
Mais	Ungräser + Unkräuter Ungräser + Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat bis 5 Tage nach der Saat		3,0	3,0	-	-	5,0	3,0	-	2,4	2,25	3,75	1,6	2,5	5,0**
				-	3,0	-	3,0	-	-	-	2,4	3,75	3,75	1,6	2,5	-
<b>Rüben:</b>																
Zuckerrübe	Ungräser + Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat		3,0	3,0	-	-	5,0	3,0	-	2,4	2,25	3,75	1,6	2,5	-
Zuckerrübe	Ungräser + Unkräuter	bis 5 Tage nach der Saat		-	3,0	-	3,0	-	-	-	2,4	3,75	3,75	1,6	2,5	-
Zuckerrübe, Futterrübe	Ungräser + Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat		-	3,0	-	-	-	3,0	-	2,4	2,25	3,75	1,6	2,5	-
Zuckerrübe, Futterrübe	Einzelpflanzenbeh. / streichen Schosserrüben, Ackerkratzdistel	bei Spätverunkrautung		33% (max. 3 l/ha)	-	-	-	-	-	-	-	25% (max. 7,5 l/ha)	-	-	33% (max. 5 kg/ha)	-
<b>Ackerbaukulturen:</b>																
Ackerbaukulturen	Einzelpflanzenbeh. / streichen UG + UK + schwer bekämpfbare UK	während der Vegetationsperiode		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33% (max. 5 kg/ha)	-
Ackerbaukulturen (u.a. Getreide, Raps, Mais, Leguminosen)	Ungräser + Unkräuter, Ausfallkulturen	nach der Ernte oder nach dem Wiedereergrünen		5,0	5,0	5,0	5,0	-	5,0	4,0	4,0	3,75	3,75	2,65	2,5	5,0
				-	5,0	5,0	-	-	5,0	-	4,0	3,75	-	2,65	2,5	-
Ackerbaukulturen	Quecke	Stoppelbehandlung Herbst nach der Ernte		-	5,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-	2,65	-	-
Ackerbaukulturen	Ungräser + Unkräuter	bis 4 Tage vor der Saat		-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-
Ackerbaukulturen	Ungräser + Unkräuter	bis 2 Tage vor der Saat		-	3,0	-	-	-	-	-	2,4	2,25	3,75	1,6	2,5	-
Ackerbaukulturen ausgen. Raps	Ungräser + Unkräuter	VA bis 5 Tage nach der Saat		-	3,0	-	-	-	-	-	2,4	3,75	3,75	1,6	2,5	-
<b>Grünland:</b>																
Wiesen und Weiden	Ungräser + Unkräuter Quecke, Ampfer-Arten	vor der Saat mit nachfolgendem Umbruch		-	4,0	4,0	-	-	-	4,0	3,2	-	3,75	2,12	2,5	-
				4,0	4,0	-	4,0	-	-	-	3,2	3,0	-	2,12	-	-
Wiesen und Weiden	Einzelpflanzenbeh. / streichen Ampfer-Arten, Ackerkratzdistel	während der Vegetation		33% (max. 4 l/ha)	-	-	-	-	-	-	-	25% (max. 7,5 l/ha)	33%° (max. 3,75 l/ha) (14Tg)	-	-	-
Gräser zur Saatguterzeugung	Einzelpflanzenbeh. / streichen Ungräser + Unkräuter	Frühjahr bis Frühsommer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33%° (max. 3,75 l/ha) (14Tg)	-	-	-

Nähere Angaben zu Auflagen u.ä. unter [www.lksh.de](http://www.lksh.de) > Landwirtschaft > Pflanze bei den jeweiligen Kulturen > Pflanzenschutz > Glyphosat

\* nicht in Roggen und Triticale!

° Art. 51-Zulassung (ehemals § 18-Genehmigung)

\*\* Getreide bis max. 3 Tage vor der Saat

\*\*Mais bis max. 1 Tag vor der Saat